




Liste des médicaments per os concernant l'écrasement des comprimés et l'ouverture des gélules


Mise à jour décembre 2012


Légende:


 Dissolution possible dans de l'eau (= D)

 Ne pas ouvrir les capsules (= C)



 Ne pas ouvrir les gélules (= NO)






 Ouverture possible des gélules (=O)











 Ne pas écraser les comprimés (= NE)











 Ecrasement possible des comprimés (= E)










Les lettres D; C; NO; O; NE; E correspondant chacune à une recommandation sont dissimulées derrière chaque image afin de vous permettre de réaliser des tris par type de recommandations. Par exemple : si vous recherchez toutes les spécialités dispersibles vous pouvez faire un tri dans la colonne recommandations en affichant tous les "D".












Spécialité	Dénomination(s) commune(s) de base	Formes galéniques	Recommandations	Remarque, explication	Alternative	Pertinence	Commentaire labo
Abilify 10 et 15mg	Aripiprazole	Comprimé orodispersible		Laisser fondre sous la langue ou dans un verre d'eau		3 oui/3 + labo	Possibilité de le dissoudre dans l'eau et de boire la suspension
Abilify 5mg, 10 et 15mg	Aripiprazole	Comprimé			Abilify 10 mg cp orodispersible	2 oui/4 + labo	N'est ni GR, ni LP donc rien ne s'y oppose mais aucune donnée (12/11/12)
Actifed rhume	Paracétamol, Pseudoéphédrine, Diphenhydramine	Comprimé		D'après le RCP 2011 "à avaler tel quel avec une boisson (eau, lait, jus de fruit)"		1 non/1 + labo	Dans l'absolu oui mais on ne peut pas garantir l'absence d'interactions entre le comprimé écrasé et le support dans lequel on ajoute le cp écrasé. Il n'y a pas de problème si le support utilisé est de l'eau.
Actiskan 5mg, 10mg, 20mg et 30mg	Morphine	Gélule		Stupéfiants. Ne pas écraser les granules. Mélanger avec un aliment semi-solide (purée, confiture, yaourt) (info 2011)		10 oui/10	


Actonel 5mg et 35mg	Risedronate	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer, ne pas laisser fondre dans la bouche. A administrer à distance des repas. Ne pas s'allonger dans les 30 min suivant la prise. Ne pas administrer le comprimé écrasé sans sonde car risque d'oesophagite. Interactions avec les cations polyvalents (calcium, fer, aluminium, magnésium...) (info 2011)	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Protelos 2g, granulés pour susp buv en sachet	6 non/6	
Acuilix 20mg/12,5 mg	Hydrochlorothiazide, Quinapril	Comprimé pelliculé sécable			<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autre IEC+ diurétique: Zestoretic comp	1 non/1 + labo	Aucune étude
Acuitel 5 et 20 mg	Quinapril	Comprimé enrobé sécable			<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autre IEC: Zestril 20mg comp	1 non/1 + labo	Aucune étude n'a été menée pour évaluer la pharmacocinétique, la stabilité, l'efficacité ou la tolérance des cps écrasés ou pilés puis mélangés dans de l'eau ou dans d'autres diluants (compote de pomme, autres aliments). Donc pas de recommandations de la part du laboratoire.
Adalate 10mg	Nifedipine	Capsule molle		Ne pas ouvrir, Ne pas croquer, PA photosensible à Administration immédiate. Prise à distance des repas.	Nifedipine Ratiopharm 20mg/ml, sol buv en goutte (ATU nominative) <u>ou</u> <u>Sur avis médical et prescription</u> : Autre inhibiteur calcique sélectif à effets vasculaires: Amlor gélule, Isoptine 40mg etc...	2 non/3 + labo	aucune étude pour confirmer que la pharmacocinétique serait inchangée PA photosensible
Adalate LP 20mg	Nifedipine	Comprimé à libération prolongée		Prise à distance des repas, ne pas croquer (info 2011)	Nifedipine 20mg/ml, sol buv en goutte (ATU nominative) <u>ou</u> <u>Sur avis médical et prescription</u> : Autre inhibiteur calcique sélectif à effets vasculaires: Amlor gélule, Isoptine 40mg etc...	2 non/2 + labo	non. Le PA est photosensible.
Adancor 10mg, 20mg	Nicorandil	Comprimé sécable, comprimé		administration immédiate (sensible à l'humidité) (Info 2011)		6 oui/6 + labo	Il est possible de broyer les cp, cependant n'ayant pas de données de stabilité après broyage, ceci est à faire de manière extemporanée
Adiazine 500mg	Sulfadiazine	Comprimé		RCP du 12/05/2011: Peut être écrasé et mélangé à un aliment (purée, jus de fruit, yaourt)		3 oui/3	














Adrovanse 70mg/2800 UI et 70mg/5600 UI	Alendronate , colécalciférol	Comprimé		PA irritant pour les muqueuses buccales et oesophagiennes, ne pas écraser, croquer ou dissoudre dans la bouche (info 2011)		2 non/2	
Aérius	Desloratadine	Comprimé pelliculé		Avaler le comprimé avec de l'eau au moment ou en dehors des repas.	Aerius 0.5mg/ml, sirop, fl. de 150ml	3 oui/6 + labo	L'écrasement est possible et la poudre peut être administrée dans la sonde entérale. Cp pelliculé afin de masquer le goût, Il existe une alternative par une solution buvable.
Akineton LP 4 mg	Bipéridène	Comprimé pelliculé à libération prolongée			<u>Sur avis et prescription médicale :</u> Autre Anticholinergique Antiparkinsonien: Artane buvable	5 non/5	
Aldactazine 25mg/15mg	Altizide; Spironolactone	Comprimé enrobé sécable		A administrer au cours ou en fin de repas. Eviter l'administration en fin de journée.		6 oui /8+ labo	La formulation n'est pas à libération prolongée, modifiée ou retardée. Aucune étude n'a été menée donc le labo n'a pas de recommandation à proposer (14/11/2012)
Aldactone 25, 50 et 75 mg	Spironolactone	Comprimé pelliculé sécable		Goût très désagréable Mettre en suspension dans un liquide (sirop, solution de méthylcellulose 20%). (Info 2011)		8 oui/8 + labo	Possibilité d'administrer en suspension dans un liquide (sirop ou solution de méthyl-cellulose) des cp de 25mg pour les enfants de moins de 6 ans. Pas d'étude clinique menée avec des cp broyés mis en gélules.
Aldalix 50 mg/20 mg	Furosémide; Spironolactone	Gélule			Spironolactone 50 mg + furosémide 20 mg(Lasilix sol buv)	1 non/2 + labo	Aucune étude n'a évalué la pharmacocinétique, la stabilité, l'efficacité ou la tolérance après ouverture donc le labo n'a pas de recommandation à proposer (14/11/2012)
Aldomet 250mg et 500mg	Methyldopa	Comprimé pelliculé		Principe actif photosensible à Administration immédiate		2 oui/2	
Alepsal 15, 50, 100 et 150 mg	Phenobarbital ; Cafeine	Comprimé		mélanger avec un aliment Très dur à écraser		2 oui/2	
Alkeran 2mg	Melphalan	Comprimé pelliculé		 Produit cytotoxique Ne pas croquer, éviter de le manipuler. La prise simultanée d'aliments La poudre peut être		3 non/3	
Alkonatrem	Demeclocycline	Gélule		mélangée à des aliments pour l'administration mais éviter avec le lait, les antiacides. A distance des sels de fer et topiques gastro-intestinaux (RCP 2012)		1 oui/2 + labo	ouverture possible
Allopurinol 100mg, 200, 300 mg	Allopurinol	Comprimé		Administrer avec boisson ou aliment		4 oui/4 + labo	oui



Alpress LP 2,5mg et 5mg	Prazosine	Comprimé LP osmotique		D'après le RCP ne pas casser, ni broyer, ni mâcher	<u>Sur avis et prescription médicale :</u> Autre alpha 1 bloquant: Eupressyl ou Mediatusyl 30mg ou 60mg ou Minipress 1mg et 5mg, comprimé (info 2011)	6 non/6	
Altéis 20mg	Olmésartan	Comprimé pelliculé		-	<u>Sur avis et prescription médicale :</u> autres sartans: Atacand, Aprovel, Cozaar 2,5 mg/ml pdre et sol buv, Tareg 3mg/ml sol buv. (Info 2011)	1non/1 +labo	Absence d'étude de biodisponibilité donc non recommandé par le labo
Amarel 1, 2, 3 et 4 mg	Glimepiride	Comprimé		D'après le RCP 2012: "les cps sont à avaler entiers avec un peu de liquide."		5 oui/5	
Amlor 5mg et 10mg	Amlodipine	Gélule		Ne pas écraser le contenu		9 oui/9 + labo	Etude ayant montré une absorption similaire entre la prise sous forme de gélule ou en solution dans l'eau distillée mais l'emploi par une voie d'administration autre que l'AMM est non préconisé par le labo
Augmentin 500mg /62,5mg	Amoxicilline; Acide clavulanique	Comprimé pelliculé		De préférence en début de repas	Augmentin 500/62,5mg, susp buv, sachet	7 non/7 + labo	interdit d'écraser les comprimés
Anafranil 10 et 25mg	Clomipramine	Comprimé enrobé		Produit sensible à la lumière: administration immédiate (info 2011)		3 oui/5 + labo	Si aucune autre alternative n'est possible et que l'état du malade le nécessite seules les formes Cp enrobés à 25 ou 10 mg peuvent être écrasées
Anafranil 75mg	Clomipramine	Comprimé pelliculé sécable		Produit sensible à la lumière: administration immédiate (info 2011)	Anafranil 10 ou 25 mg cp enrobés	5 non/5 + labo	Risque de modifier la pharmacocinétique car cp pelliculé à matrice
Anandron 50 et 150 mg	Nilutamide	Comprimé				2 oui/2	
Anausin métoclopramide LP 15mg	Métoclopramide	Comprimé à libération prolongée		Forme LP. Ne pas croquer, ne pas écraser		1 non/1	pas d'info labo mais forme LP
Ancotil 500mg	Flucytosine	Comprimé sécable		possibilité de broyer les comprimés pour les enfants de moins de 6 ans ayant des difficultés pour avaler les cp , administration immédiate car sensible à l'humidité (RCP 16/03/2012)		1 oui/1	Dans les cas exceptionnels où il est impossible de faire autrement, il est alors important d'éviter les phénomènes d'échauffement lors du broyage. De plus, ne disposant pas de donnée de stabilité dans ces conditions, il convient de ne pas réaliser ces préparations à l'avance, et d'éviter toute contamination. (info 2011)
Androcur 50mg et 100mg	Cyproterone	Comprimé sécable		-		7 oui/7+labo	









Ansatipine 150mg	Rifabutine	Gélule		-		2 oui/2 + labo	Pas de donnée concernant l'ouverture des gélules. Si l'administration par voie orale de la forme galénique modifiée est envisagée, seule une faible différence de la pharmacocinétique et de l'absorption de l'Ansatipine devrait être observée, le site d'absorption restant le même. L'ouverture des gélules devra cependant être réalisée juste avant l'administration, car pas de donnée de stabilité dans ces conditions d'utilisation. La rifabutine étant difficilement soluble dans l'eau, mélanger la poudre avec un aliment (ex: compote de pomme).
Aotal 333mg	Acamprostate	Comprimé gastro-résistant		RCP 20/01/2012: A distance des repas de préférence (prise avec aliments diminue la biodisponibilité) Ne pas croquer, écraser ni mâcher.		9 non/9	
Apranax 550 et 750mg	Naproxene	Comprimé enrobé (sécable uniquement pour le 550mg)		A administrer au cours ou en fin de repas. Goût très amer, irritation de la gorge. Ne pas croquer, écraser ni mâcher (info 2011)	Apranax 500mg, granulés pour susp buv, sachet	2 non/3+labo	Aucune étude car existe une forme buvable
Aprovel 75mg, 150mg et 300mg	Irbesartan	Comprimé pelliculé		-		7 oui/8 +labo	Hors AMM, aucune donnée de bioéquivalence ou de stabilité. Enrobage masque l'amertume du PA. Si écrasé doit être mélangé dans un aliment (car insoluble) et administré de façon extemporanée
Aptivus 250mg	Tipranavir	Capsule molle		 Produit cytotoxique Ne pas croquer, administrer avec aliments sans croquer ni écraser		1 non/1 + labo	Contient une solution liquide et huileuse. Ne pas ouvrir les capsules.
Arava 10, 20 et 100mg	Leflunomide	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer, écraser ni mâcher. RCP : Les cp doivent être avalés entiers avec une quantité suffisante de liquide.		2 non/2 + labo	Aucune étude, PA toxique (toxicité limitée par l'enrobage) et très sensible à l'humidité
Arcalion	Sulbutiamine	Comprimé enrobé		Avaler avec eau (RCP 02/2012)		labo	peut être administré en suspension après broyage, la cinétique sera peu modifiée (03/01/2013)
Arestal 1mg	Loperamide	Comprimé			Imodium susp buvable ou lyc	1 oui/1 + labo	Pas d'étude de biodisponibilité donc on ne peut prévoir son efficacité après écrasement bien qu'il s'agisse d'un cp nu sans enrobage.
Aricept 5mg et 10mg	Donepezil	Comprimé orodispersible		A placer sur la langue avec ou sans eau		5 oui/5	
Aricept 5mg, 10 mg	Donepezil	Comprimé pelliculé			Aricept comprimés orodispersibles	3 oui/3	






Arimidex 1 mg	Anastrozole	Comprimé pelliculé		Ne pas faire manipuler par une femme enceinte. Se protéger avec gants et masque; Adm. aussitôt après écrasement		3 oui/5 + labo	Pas de donnée de pharmacocinétique mais forme galénique simple, il semble probable qu'il ne devrait pas y avoir de modification majeure des paramètres pharmacocinétiques. Administration extemporanée, Ne pas faire manipuler le produit par une femme enceinte, Se protéger avec des gants et masque
Aromasine 25 mg	Exemestane	Comprimé enrobé		administration après le repas		3 non/3	
Art 50mg	Diacereine	Gélule		administrer pendant le repas, ne pas ouvrir la gélule (info 2011)		1 non/1 + labo	Pas recommandé d'ouvrir la gélule car aucune étude n'a été faite. De plus, la diacéréine est un produit potentiellement irritant (protection des muqueuses buccale et oesophagienne par la gélule).
Artane 2mg et 5mg	Trihexyphenidyle	Comprimé	 NE	-	Artane 0.1mg/gtte, sol buv en gouttes, fl. de 30ml (contient de l'alcool)	3 non/3	
Artex 5 mg	Tertatolol	Comprimé enrobé sécable		administration immédiate		1 oui/1 + labo	peut être administré en suspension après broyage, la cinétique sera peu modifiée
Arthrocin 100 et 200 mg	Sulindac	Comprimé (sécable pour le 200mg)		D'après le RCP 12/02/2011: "les cps sont à avaler tels quels, avec un grand verre d'eau, au cours du repas"		1 non/1 + labo	Pas d'étude réalisée. Ms ne semble pas poser de pb car le cp est à libération immédiate et non pelliculé. (12/11/12)
Artotec 50 mg/ 0,2mg et 75mg/0,2mg	Diclofenac ; Misoprostol	Comprimé gastro-résistant			<u>Sur avis et prescription médicale :</u> Autre AINS: Apranax sachet, Feldene 20mg etc...	1 non/1	pas d'info labo mais cp gastro-résistant donc impossible
Asasantine LP 200mg/25mg	Dipyridamole	Gélule		Ne pas écraser les microgranules LP. D'après le RCP, "les gélules doivent être avalées entières sans être croquées". Ne pas ouvrir les gélules (info 2011)		4 oui/6 + labo	Pas de donnée concernant la cinétique et l'efficacité clinique. Toutefois, les microgranules ne doivent pas être écrasés.
Atacand 4mg, 8mg, 16mg et 32 mg	Candesartan	Comprimé sécable		-		8 oui/8	
Atarax 25 et 100 mg	Hydroxyzine	Comprimé pelliculé sécable			Atarax Sirop <u>Sur avis et prescription médicale :</u> Xanax	6 oui/8 + labo	Possible même s'il existe une alternative par un sirop buvable
Avlocardyl 40mg	Propranolol	Comprimé sécable		prise pendant le repas		8 oui/8	
Avlocardyl LP 160mg	Propranolol	Gélule		Ne pas écraser le contenu (microgranules gastro-résistantes)		6 oui/8 + labo	Résistance possible au moment de l'ouverture car la fermeture de la gélule est verrouillée pour freiner l'ouverture inappropriée. Pas d'étude garantissant une pharmacocinétique identique (des microgranules peuvent être retenus dans l'oesophage voire dans la sonde si administration dispersée).
Azadose 600mg	Azithromycine	Comprimé pelliculé		-		1 oui/1 + labo	Les cps doivent être avalés ou écrasés pour les patients présentant des difficultés à la déglutition.










Azantac 150mg et 300mg	Ranitidine	Comprimé pelliculé		Principe actif photosensible à Administration immédiate	Azantac 150 mg cp effervescents	2 non/3+labo	Le labo déconseille d'écraser les comprimés car PA photosensible.
Bactrim 400mg/80mg et Bactrim forte 800mg/160mg	Sulfamethoxazole; Trimethoprim	Comprimé (sécable pour le 400mg/80mg)		Administrer au cours du repas	Bactrim 100 ml suspension buvable	6 non/10 + labo	Aucune étude car alternative par une suspension buvable
Baraclude 0,5 et 1 mg	Entecavir	Comprimé pelliculé			Baraclude solution buvable 0,05 mg/ml flacon de 210 ml à ne pas mélanger avec de l'eau, d'autres solvants ou d'autres médicaments	labo	Aucune donnée sur bioéquivalence ni sur la stabilité de l'unité thérapeutique à l'état de poudre, Rien ne s'oppose à les couper et/ou les écraser, Toute modalité d'utilisation non validée par AMM est sous la responsabilité des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge thérapeutique,
Basdene 25mg	Benzylthiouracile	Comprimé		administrer au moment des repas		2 oui/2	
Baypress 10 et 20 mg	Nitrendipine	Comprimé				1 non/1 + labo	pas d'essai réalisé donc non recommandé d'écraser le cp
Becilan 250mg	Pyridoxine	Comprimé sécable		Le médicament est absorbé au niveau de l'intestin grêle(RCP du 03/05/2012)		2 oui/2	Aucune donnée, Biodisponibilité B6 totale mais écrasement non recommandé par le labo (05/11/12)
Befizal 200mg	Bezafibrate	Comprimé pelliculé		administration lors du repas		1 oui/1 + labo	Les cp de BEFIZAL 200mg peuvent être écrasés. Comme aucune étude n'a été réalisée, l'administration de comprimés écrasés relève de la seule responsabilité de l'administrateur.
Befizal LP 400mg	Bezafibrate	Comprimé enrobé à libération prolongée			Befizal 200mg cp pelliculé	1 non/1 + labo	les cps de BEFIZAL LP 400mg ne peuvent pas être écrasés. En effet, il s'agit d'une forme à libération prolongée.
Belustine 40mg	Lomustine	Gélule		 Produit cytotoxique, administration le soir ou 3h après un repas		2 non/2	
Benemide 500mg	Probenecide	Comprimé sécable		administration lors du repas, écrasement possible dans du yaourt ou un liquide sucré (RCP 26/04/2012)		3 oui/3	
Betahistine 8mg	Betahistine	Comprimé		D'après le RCP 11/07/2011"les Cps doivent être avalés sans être croqués avec un verre d'eau au cours du repas".		6 oui/6+labo	Possible d'un point de vue galénique, mais aucune donnée quant à la modification éventuelle de la biodisponibilité (12/11/12)
Bevitine 250mg	Thiamine	Comprimé enrobé		D'après le RCP 20/05/2011"avalé, sans croquer, avec un peu d'eau". Ne pas sucer		3 oui/3	







Biltricide 600mg	Praziquantel	Comprimé pelliculé quadriséable		Se désagrège dans l'eau Ne pas croquer ni mâcher. Ne pas écraser. Prendre après le repas		3 oui/3	
Bipreterax	Perindopril ; Indapamide	Comprimé pelliculé		administrer le matin avant le repas		4 oui/4 + labo	Peut être administré en suspension après broyage, la cinétique sera peu modifiée
Birodogyl	Spiramycine ; Metronidazole	Comprimé pelliculé		pendant le repas		1 oui/1 + labo	Les cps ne sont pas gastro-résistants, ils est donc possible de les écraser pour une administration par sonde entérale. Cependant il n'y aucune étude spécifique réalisée avec les cps écrasés ni par sonde. Pas de garantie que les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, ainsi que la tolérance, restent inchangés lors de l'administration de cps écrasés.
Bi-tildiem LP 90mg et 120mg	Diltiazem	Comprimé enrobé		Ne pas croquer	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : autres inhibiteurs calciques : Isoptine, Amlodipine, Loxen, Nifédipine sol buv, Unicordium	7 non/7 + labo	Ne doivent pas être broyés car leur présentation galénique particulière est conçue pour une LP
Brexin 20 mg	Piroxicam	Comprimé effervescent		A administrer au cours du repas, Dissoudre dans l'eau,		2 oui/2	
Brexin 20 mg	Piroxicam	Comprimé sécable			Brexin 20 mg, cp effervescents	2 non/2	
Bricanyl LP 5mg	Terbutaline	Comprimé à libération prolongée		Ne pas croquer. A administrer au cours ou en fin de repas	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : autre beta-stimulant : Oxeol 10mg et 20mg - Ventoline buvable - Salbumol suppo	9 non/9	
Briem 5mg et 10mg	Benazepril	Comprimé pelliculé (sécable pour le 5 mg)		-	Cibacene 5mg et 10mg, comprimés	2 non/3 + labo	Risque de modifier la pharmacocinétique et plus précisément la biodisponibilité
Bromokin 2,5mg et 5mg	Bromocriptine	Comprimé sécable		A administrer au cours du repas		4 oui/4	
Buprenorphine 0,4mg, 2mg et 8mg	Buprenorphine	Comprimé sublingual		Laisser fondre sous la langue		3 non/3+labo	Produit détruit par effet de premier passage hépatique lorsqu'il est administré par voie orale. Seule la voie sublinguale en laissant fondre sous la langue est adaptée et validée
Burinex 1 et 5 mg	Bumetanide	Comprimé sécable		administration immédiate car photosensible		9 oui/9	
Caltrate 600mg	Calcium	Comprimé pelliculé		A prendre à distance des repas		1 oui/1 + labo	Les comprimés peuvent être écrasés sans problème
Caltrate vit D3 600mg/400UI	Calcium ; Colecalciferol	Comprimé pelliculé				1 oui/1 + labo	Les comprimés peuvent être écrasés sans problème
Captea 50mg/25mg	Captopril, Hydrochlorothiazide	Comprimé sécable				1 oui/1 + labo	aucune étude











Captopril 25mg et 50mg	Captopril	Comprimé sécable		administrer avant le repas		2 oui/2 +labo	Aucune donnée ne permettant d'écraser les cps ou ouvrir les gélules
Carbolevure	Saccharomyces cerevisiae, Charbon activé	Gélule		ne pas ouvrir, ni écraser, ni croquer (info 2011)		1 non/2 + labo	Risque de modifier la pharmacocinétique et plus précisément la biodisponibilité
Cardensiel 1,25 - 2,5 - 3,75 - 5 - 7,5 - 10 mg	Bisoprolol	Comprimé pelliculé sécable		D'après le RCP du 02/07/2012 "ne doivent pas être mâchés" "Ne pas croquer ni écraser" Theriaque	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : autres bêta-bloquants sans ASI : Tenormine, Detensiel, Seloken	5 oui/10 + labo	Goût amer masqué par le pelliculage, Administration extemporanée
Casodex 50mg	Bicalutamide	Comprimé enrobé		 Ne pas manipuler chez la femme enceinte. Protection par gants et masque. Adm. extemporanée après mise en suspension car risque de formation de cristaux.		2 oui/5 + labo	Pas d'étude mais ce n'est ni une forme LP ni gastrorésistante, Administration extemporanée car risque de formation de cristaux après mise en suspension, Ne pas faire manipuler le produit par une femme enceinte, Se protéger avec des gants et masque,
Catapressan 0,15 mg	Clonidine	Comprimé sécable			<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autres antihypertenseurs d'action centrale : Aldomet, Hyperium	3 non/6 + labo	pas recommandé d'écraser le comprimé car aucune étude n'a été réalisée
Cebutid 50mg et 100mg	Flurbiprofene	Comprimé enrobé		D'après le RCP 01/03/2012 "les cps sont à avaler tels quels sans les croquer, avec un verre d'eau, de préférence au cours d'un repas".		2 oui/2	
Celebrex 200mg	Celecoxib	Gélule				3 oui/4 +labo	Aucune étude donc non recommandé par le labo (hors AMM). Une étude interne de biodisponibilité a conclu que des doses uniques de 100 mg étaient bien tolérées, qu'elles soient administrées sous forme de gélules intactes ou saupoudrées sur de la compote de pommes. (absence de modification, aucun produit de dégradation) RCP de la Suisse: Il est possible d'ajouter le contenu d'une gélule à de la compote de pommes, de gruau de riz, du yaourt ou de la banane écrasée. Vider le contenu de la gélule dans une cuillère à café rase de compote de pommes, crème de riz, yaourt ou purée de banane et le prendre immédiatement avec de l'eau. Le contenu saupoudré sur de la compote de pommes, crème de riz ou yaourt se conserve au réfrigérateur jusqu'à 6 jours. Le contenu saupoudré sur de la purée de banane doit être pris immédiatement (14/11/2012)

Celestamine 0,25mg/2mg	Betamethasone , Dexchlorpheniramine	Comprimé			<u>Sur avis et prescription médicale</u> : celestene 0,05% solution buvable, betnesol cp eff, celestene 2mg cp dispersible sécable + polaramine 0,01% sirop	labo	existence d'une alternative celestene + polaramine en solution buv
Celestene 2 mg	Betamethasone	Comprimé dispersible sécable		Les cp peuvent être avalés tels quels avec un peu d'eau ou dissous dans un peu d'eau, de préférence au cours des repas.(Info 2011)	Celestene 0,05% sol buv flacon 30 ml	1 non/2	pas d'info labo mais existence d'une alternative sous forme de solution buvable
Celiprolol 200mg	Celiprolol	Comprimé pelliculé sécable	 ou mais uniquement si administration par SNG	Administration uniquement par sonde naso-gastrique Administrer de préférence le matin avec un liquide à jeun.Ne doit pas être en contact avec la muqueuse buccale	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : SECTRAL 40mg/ml 125 ml solution buvable	5 oui/7+labo	Pas de contact avec les muqueuses, Administration uniquement par sonde nasogastrique
Cellcept 250mg	Mycophenolate	Gélule		Ne pas ouvrir la gélule, Administrer au cours ou en dehors des repas	Cellcept 1g/5ml, poudre pour suspension buvable	4 non/4 + labo	Etant donné que le mycophénolate mofétil a un effet tératogène chez le rat et le lapin, le RCP précise "qu'il ne faut pas écraser les cps ni ouvrir ou écraser les gélules de Cellcept", Il existe une alternative Cellcept poudre pour suspension buvable (qui peut être administré par un tube nasogastrique d'un diamètre mini de 8 French (soit 1,7 mm)),
Cellcept 500mg	Mycophenolate	Comprimé pelliculé		Ne pas écraser, Administrer au cours ou en dehors des repas	Cellcept 1g/5ml poudre pour suspension buvable	labo	Etant donné que le mycophénolate mofétil a un effet tératogène chez le rat et le lapin, le RCP précise "qu'il ne faut pas écraser les cps ni ouvrir ou écraser les gélules de Cellcept", Il existe une alternative Cellcept poudre pour suspension buvable (qui peut être administré par un tube nasogastrique d'un diamètre mini de 8 French (soit 1,7 mm)),
Celltop 25, 50 et 100mg	Etoposide	Capsule molle		Effet cytolytique		1 non/1	pas d'info labo mais impossible car capsule (contenu liquide huileux)
Ceris 20mg	Trospium	Comprimé enrobé		Goût très amer. A avaler avec un grand verre d'eau, à jeun.	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Ditropan 1 mg/ml sol buv ATU nominative	1 non/1 + labo	Ne pas écraser, prendre le comprimé en entier
Cervoxan 60 mg	Vinburnine	Gélule		Avaler la gélule sans l'ouvrir, avec un peu d'eau au début du repas (Info 2011)		1 non/1 + labo	En l'absence de donnée de stabilité, il est conseillé de ne pas les ouvrir








Chibro-proscar 5 mg	Finasteride	Comprimé pelliculé		Pas de manipulation par la femme enceinte,		7 oui/8 + labo	L'administration après écrasement serait en dehors du mode d'administration de l'AMM. Aucune étude n'est disponible à ce jour. Néanmoins si cette manipulation doit impérativement être effectuée en vue d'une administration par sonde, il faut mettre en suspension le comprimé au moment de l'administration au malade. Une femme enceinte ou en âge de procréer, ne doit jamais manipuler des comprimés écrasés ou cassés (peut entraîner des anomalies des organes génitaux externes chez le fœtus mâle).
Chloraminophène 2mg	Chlorambucil	Gélule		produit cytotoxique administration à jeun ne pas ouvrir, ni écraser, ni croquer		1 non/1	pas d'info labo mais ne pas ouvrir car produit cytotoxique
Chondrosulf 400mg	Chondroïtine	Gélule		D'après le RCP "les gélules sont à avaler telles quelles avec un grand verre d'eau". Ne pas ouvrir, ni écraser RCP du 23/04/2012. Therisque 06/02/2012	Chondrosulf Granulés pour suspension buvable à 400 mg (sachets)	1 oui/1	pas d'info labo mais alternative possible par une forme buvable
Chronadate LP 30 mg	Nifedipine	Comprimé osmotique pelliculé à libération prolongée		Forme LP, à avaler sans croquer. Produit photosensible, photoprotégé dans les cp. Le cp ne doit pas être rompu. Ne sortir le comprimé de son alvéole qu'immédiatement avant l'emploi. (Info 2011)	Nifedipine 20mg/ml sol buv en gouttes (ATU nominative) ou <u>Sur avis médical et prescription</u> : Autre inhibiteur calcique sélectif à effets vasculaires: Amlor gélule, Isoptine 40mg etc...	4 non/4	Non; le PA est photosensible. La galénique est à libération modifiée
Cibacene 5mg et 10mg	Benazepril	Comprimé pelliculé (sécable pour le 5 mg)				1 oui/1	Le labo ne peut recommander le fait de broyer les cps, dans la mesure où cela n'est pas validé par l'AMM. De plus, il peut se produire une surchauffe du cp. Le labo ne dispose pas d'éléments de stabilité et ne peut garantir la stabilité des préparations.(info 2011)
Cipralan 130 mg	Cibenzoline	Comprimé pelliculé sécable			<u>Sur avis médical et prescription</u> : Autre antiarythmique: Flécaine 100mg, Rythmol 300mg etc...	3 non/3	

Ciflox 250mg, 500mg et 750mg	Ciprofloxacine	Comprimé pelliculé (sécable pour le 250mg et le 500 mg)		RCP du 05/09/2012: Les cp doivent être avalés avec une boisson, sans être croqués. Ne doit pas être pris avec des produits laitiers (lait, yaourt) ou des jus de fruits enrichis en minéraux (jus d'orange enrichi en calcium)	Ciflox granulés et solvant pr susp buv à 500 mg/5 ml : Flacon de 15,9 g de granulés et flacon de 86 ml de solvant (Aucun ajout ne doit être effectué à la suspension finale)	7 oui/7+labo	Validé à l'AMM, Chez les patients sous SNG le cp peut être administré par cette voie après broyage à jeûn ou au cours d'une alimentation entérale sans modification de la biodisponibilité par rapport à la forme intacte
Clamoxyl 500 mg	Amoxicilline	Gélule		-	Clamoxyl 500mg/5ml, poudre pour susp buv	2 non/6 + labo	L'AMM indique que les gélules doivent être avalées sans les ouvrir donc le labo ne recommande pas l'ouverture. Pas d'étude.
Clamoxyl 1 g	Amoxicilline	Comprimé dispersible		Dispenser dans un verre d'eau avant la prise. Administrer avant, pendant ou après le repas.	Clamoxyl 500mg/5ml, poudre pour susp buv	4 oui/4	
Clarityne 10mg	Loratadine	Comprimé			Clarityne sirop 1mg/ml	2 non/2	
Clastoban 800mg	Clodronate	Comprimé pelliculé		Laisser fondre le comprimé dans un verre d'eau, le matin à jeun.		2 oui/2 +labo	Recommandé de les laisser fondre dans un verre d'eau plutôt que de les écraser (le délitement n'est pas immédiat)
Cléridium 150 mg	Dipyridamole	Comprimé pelliculé sécable		Trop petit pour être écrasé		1 non/1 + labo	Aucune donnée sur les cps écrasés
Clopixol 10 et 25mg	Zuclopenthixol	Comprimé pelliculé			Clopixol 2 % sol buv (1mg/goutte)	2 non/2	
Coaprovel 150 et 300 mg	Hydrochlorothiazide; Irbesartan	Comprimé pelliculé				4 oui/4	
Colchicine 1 mg	Colchicine	Comprimé		A administrer au cours du repas. Goût amer, à administrer très rapidement, mélanger à de la compote		8 oui/8	
Colchimax 1mg / 12,5mg / 50mg	Colchicine; Opium ; Tiemonium	Comprimé pelliculé sécable				8 oui/8	
Coltramyl 4 mg	Thiocolchicoside	Comprimé		D'après le RCP 15/05/2012 "Avaler les comprimés avec un verre d'eau" au cours du repas		labo	Aucune donnée relative aux cps écrasés, Ne peuvent pas garantir les paramètres pharmacocinétiques pharmacodynamiques et la tolérance, Néanmoins d'un point de vue galénique le cp peut être écrasé et pris de façon extemporanée








Combivir 150mg/300mg	Lamivudine; Zidovudine	Comprimé pelliculé sécable		De préférence à jeun. Peuvent être écrasés et mélangés à une petite quantité de nourriture semi-solide ou de liquide, ingéré immédiatement (Info 2011)	Epivir 10mg/ml sol buv, fl. de 240ml (ou Zeffix 5mg/ml sol buv fl 240ml) + Retrovir 10mg/ml, susp buv, fl. de 200ml	4 non/5 + labo	Les cps doivent être idéalement avalés sans les écraser, afin de garantir l'administration de la dose complète, Néanmoins, pour les patients dans l'incapacité d'avaler des comprimés, ils peuvent être écrasés et mélangés à une petite quantité de nourriture semi-solide ou de liquide, le tout devant être ingéré immédiatement, Cette conclusion est basée sur les données physico-chimiques et pharmacocinétiques, en supposant que le patient ingère immédiatement la totalité du comprimé écrasé, Par ailleurs, les PA de COMBIVIR existent séparément sous forme buvable : Epivir et Retrovir solution buvable,
Comtan 200mg	Entacapone	Comprimé pelliculé				3 oui/6 + labo	Aucune donnée, Ce n'est pas une forme LP ni gastro- résistante, Risque de perte de principe actif au moment du broyage, Le PA est jaune et très colorant, Le cp broyé est à administrer sur un aliment semi-solide et surtout ne pas dissoudre au préalable.
Concerta LP 18, 36 et 54 mg	Methylphenidate	Comprimé à libération prolongée		Forme LP, doit être avalé en entier avec une boisson et ne doit être ni mâché, ni divisé, ni écrasé (RCP 20/03/2012)		1 non/1	pas d'info labo mais forme à LP donc impossible
Contalax	Bisacodyl	Comprimé gastro- résistant		D'après le RCP "les cps doivent être avalés avec un verre d'eau, sans les croquer".	<u>Sur avis médical</u> Autre laxatif stimulant: Dulcolax 10 mg suppo, huile de ricin , X-prep poudre pour sol buv, Fructine cp à sucer, Citrafleet poudre pr sol buv, Picoprep poudre pr sol buv...	2 non/2	
Contramal 50 mg	Tramadol	Gélule		Mélanger dans aliments semi-liquides	Contramal solution buvable à 100 mg/ml : Flacon compte-gouttes de 10 ml avec du liquide ou sur un morceau de sucre	5 oui/5+labo	Contenu amer donc diluer dans aliments semi-liquides
Contramal LP 100, 150 et 200 mg	Tramadol	Comprimé à libération prolongée		Les comprimés ne devront pas être fractionnés ou mâchés (Info 2011)	Contramal 50mg gélule ou contramal sol buvable 100mg/ml	3 non/3	
Copegus 200mg et 400mg	Ribavirine	Comprimé pelliculé		D'après le RCP les cps ne doivent être ni casser, ni écraser (risque teratogène)	Rebetol 40mg/ml, sol buv, fl. de 100ml (après avis médical)	3 non/3	










Cordarone 200mg	Amiodarone	Comprimé sécable		Administrer avant, pendant ou en dehors du repas.		9 oui/9	
Corgard 80 mg	Nadolol	Comprimé sécable				2 oui/2	
Cortancyl 1mg, 5mg et 20mg	Prednisone	Comprimé (sécable pour le 20mg)		Photosensible - administration extemporanée	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Solupred cp arodispersible, ou Solupred cp effervescents, ou Solupred sol buv à 1mg/ml flacon 50 ml	7 oui/9+labo	D'un point de vue galénique les cps ne sont pas à libération modifiée, Possible de les écraser si l'administration est extemporanée car le PA est sensible à la lumière , Aucune donnée sur ce mode administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques, pharmacodynamiques et la tolérance
Corvasal 2 et 4 mg	Molsidomine	Comprimé sécable (2 mg)		administration immédiate car photosensible. Administrer au cours des repas.		8 oui/8	
Cotareg 80 mg/ 12,5mg	Hydrochlorothiazide, Valsartan	Comprimé pelliculé			<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autre Sartan + diurétique : Hytacand comp etc...	3 non/3	
Coumadine 2 et 5 mg	Warfarine	Comprimé sécable		Attention à la dose, marge thérapeutique étroite!! administration immédiate, ne pas consommer avec des aliments riches en vit K (choux, épinards, asperges..)		8 oui/8	Risque de modifier la dose par perte de PA
Coveram (Tous dosages)	Amlodipine, Perindopril	Comprimé		Le matin à jeun		labo	Peut être administré en suspension après broyage, la cinétique sera peu modifiée
Coversyl 2,5, 5 et 10 mg	Perindopril	Comprimé pelliculé		Administrer en une prise le matin avant le repas avec un verre d'eau.		7 oui/7 + labo	Peut être administré en suspension après broyage, la cinétique sera peu modifiée
Cozaar 50 et 100mg	Losartan	Comprimé pelliculé (sécable pour le 50mg)		Administrer à jeun ou au cours d'un repas.	Cozaar 2,5 mg/ml, poudre et solvant pour suspension buvable ou <u>sur avis et prescription médicale</u> : autre Sartans: Aprovel comp, Atacand comp etc...	6 oui/7 + labo	Pas d'étude faite. Le PA a une amertume marquée.
Créon 12000 U et 25000 U	Pancreatine	Gélule de microgranules gastrorésistants		Ne pas écraser le contenu. A administrer au cours ou en fin de repas. Les gélules peuvent être ouvertes et les granules gastrorésistants mélangés à du lait. (info 2011)		7 oui/7	









Crestor 5, 10 et 20 mg	Rosuvastatine	Comprimé pelliculé			Sur avis et prescription médicale : autres statines :Tahor, Pravastatine	2 oui/6 + labo	Pas d'étude réalisée mais possible car cp à libération immédiate
Crixivan	Indinavir	Gélule		goût amer mélanger avec jus, prise à jeun ou avec un toast non beurré avec de la confiture ou des fruits en conserve, du jus de pomme, du café sucré avec du lait écrémé ou demi-écrémé, ou des céréales, du lait écrémé ou demi-écrémé et du sucre (RCP 2012)		3 oui/3	
Cymbalta 30mg et 60 mg	Duloxetine	Gélule gastro-résistante			Sur avis et prescription médicale : Autre antidépresseur IRSNa : Norset 15mg/ml, sol buv fl. de 66ml, mirtazapine cp orodispersible, Laroxyl 40mg/ml flacon 20 ml	3 non/3	
Cynomel 0,025 mg	Liothyronine	Comprimé sécable		A jeun.		2 oui/2	
Cystagon 50 et 150mg	Cysteamine	Gélule		Ne pas diluer le contenu dans un liquide ou un aliment acide mais possible ds le lait, pommes de terre...		1 oui/1 + labo	D'après le RCP : Chez l'enfant jusqu'à l'âge de 6 ans environ, chez qui il existe un risque de fausse-route, les gélules doivent être ouvertes et leur contenu mélangé à la nourriture . Quelques informations préliminaires montrent que la poudre peut être mélangée parfaitement aux aliments tels que le lait, les pommes de terre et d'autres produits à base d'amidon. Il convient cependant d'éviter les boissons acides, telles que le jus d'orange, avec lesquelles la poudre se mélange mal et peut précipiter.
Cytotec 200 microg	Misoprostol	Comprimé sécable		prise avant les repas. D'après le RCP 27/03/2012 "les cp sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau"	Sur avis et prescription médicale : autre antiulcéreux en cp effervescent (Azantac, Raniplex), Ogastoro cp orodispersible	5 oui/5 + labo	Il est possible d'écraser les cps de CYTOTEC pour faciliter leur administration : ingestion en association avec un milieu liquide tel que le lait ou l'eau, à condition que cette préparation soit réellement extemporanée. En effet, la stabilité du misoprostol en milieu liquide est médiocre et la durée de vie relativement courte. Dans de telles conditions, l'ingestion d'aliments devra être stoppée 1 heure avant la prise de CYTOTEC et ne reprendra que 30 min après.
Dafalgan 1g	Paracétamol	Comprimé pelliculé		-	Dafalgan 1g cp effervescent, Efferalgan 500mg cp effervescent; Dafalgan 600mg suppositoires, Dafalgan 80/150/250 mg/ml poudre pour sol buv	2 non/2 + labo	Avaler tel quel dans l'AMM //rien ne s'oppose d'un point de vue galénique mais aucune donnée de bioéquivalence ou de stabilité//toute modalité d'utilisation non validée par l'AMM est sous la responsabilité des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge thérapeutique









Dafalgan 500mg	Paracétamol	Gélule		Ne pas écraser le contenu	Dafalgan 500mg cp effervescent; Efferalgan 500mg cp effervescent; Dafalgan 600mg suppositoire	4 non/4+labo	Avaler tel quel avec une boisson dans l'AMM //rien ne s'oppose d'un point de vue galénique mais aucune donnée de bioéquivalence ou de stabilité//toute modalité d'utilisation non validée par l'AMM est sous la responsabilité des professionnels de sante impliqués dans la prise en charge thérapeutique
Dafalgan codeïne 500mg/30mg	Paracétamol, Codeïne	Comprimé pelliculé		PA très amer, D'après le RCP 16/01/2012 "les cp sont à avaler tels quels avec un verre d'eau"	Dafalgan codéiné cp effervescent	3 non /6+labo	Pas d'écrasement ni de sécabilité mentionnés dans l'AMM//rien ne s'oppose d'un point de vue galénique mais aucune donnée de bioéquivalence ou de stabilité//toute modalité d'utilisation non validée par l'AMM est sous la responsabilité des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge thérapeutique
Daflon 500mg	Flavonoïdes (diosmine, hesperidine)	Comprimé pelliculé		au cours du repas	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : autres PA à base de flavonoïdes	5 oui/8 + labo	Peut être administré en suspension après broyage, la cinétique sera peu modifiée
Dalacine 300mg, 150mg, 75mg	Clindamycine	Gélule		incompatibilité avec ampicilline, phénytoïne, barbituriques, aminophylline, gluconate de calcium, sulfate de magnésium.		4 oui/4+labo	Aucune ref biblio // mode d'administration en ouvrant la gélule est hors amm donc non recommandé par le labo // dalacine iv pas de données validées par l'AMM pour administrer cette spécialité par SNG
Dantrium 25mg et 100mg	Dantrolene	Gélule		A administrer au cours ou en fin de repas. mélanger avec aliment, pas eau		7 oui/7	
Daonil 5mg	Glibenclamide	Comprimé sécable		A administrer au début du repas, Goût amer		8 oui/8	
Debridat 100 et 200 mg	Trimébutine	Comprimé pelliculé		-	Débridat 4,8mg/ml, susp buv, fl. de 125ml ou sachet 74,4 mg	2 oui/6 + labo	Cps ne sont ni GR ni à libération différée leur galénique ne permet pas d'en interdire le broyage // mais non recommandé par le labo car en plus alternative par forme buvable
Decontractyl 500 mg	Méphénésine	Comprimé enrobé			<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autre myorelaxant: Thiocolchicoside comprimé	1 non/2 + labo	Aucune étude // cp enrobé pour masquer le goût du PA
Dectancyl 0,5mg	Dexaméthasone	Comprimé		les comprimés peuvent être écrasés et mélangés à l'alimentation (RCP 2012)	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Celestene gouttes buvables ou cp dispersible, Solupred cp effervescent ou orodispersible ou sol buv	2 oui/3 + labo	aucune donnée sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // Au niveau galénique le cp étant nu et sécable il peut être écrasé // Le PA est peu soluble dans l'eau .
Delursan 250mg	Acide ursodésoxycholique	Comprimé pelliculé		goût très amer mélanger compote, prise pendant le repas		3 oui/3	
Dépakine chrono LP 500mg	Valproate de sodium	Comprimé pelliculé sécable		Ne pas croquer, ni écraser. A administrer au cours ou en fin de repas	Depakine 200mg/ml sol buv fl. de 40ml; Depakine 57,64mg/ml sirop fl de 150 ml; Micropakine LP 500mg, sachet	10 non/10	










Depakine 500	Valproate de sodium	Comprimé gastro-résistant		prise pendant le repas	Dépakine 200mg/ml sol buv fl. de 40ml; Depakine 57,64mg/ml sirop fl de 150 ml	3 non/3	
Depakote 250mg et 500mg	Valproate semisodique	Comprimé gastro-résistant		Ne pas croquer	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autre normothymique : Tegretol susp buv 20mg/ml fl 150 ml, Zyprexa velotab cp orodispersible	8 non/8	
Depamide 300mg	Valpromide	Comprimé gastro-résistant		Ne pas croquer, ni écraser, ni mâcher. A administrer au cours ou en fin de repas	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autre normothymique : Tegretol susp buv 20mg/ml fl 150 ml, Zyprexa velotab cp orodispersible	11 non/11	
Déprenyl 5mg	Sélégiline	Comprimé sécable		Prise le matin		5 oui/5	
Déroxat 20 mg	Paroxétine	Comprimé pelliculé sécable		Pelliculage qui masque le goût, Ne pas croquer. Administrer le matin au cours du petit déjeuner avec un grand verre d'eau.	Deroxat 2mg/ml, susp buv, fl. de 150ml	4 non/10+ labo	Si nécessaire, le cp de DEROXAT peut être écrasé pour être administré par sonde naso-gastrique. La suspension buvable peut être également administrée par sonde naso-gastrique. Cependant la suspension étant légèrement visqueuse, il est préférable de la diluer dans de l'eau immédiatement avant de l'administrer.
Détensiel 10mg	Bisoprolol	Comprimé pelliculé sécable		Goût amer		7 oui/7 + labo	Goût amer masqué par le pelliculage // administration extemporanée
Dexambutol 500 mg	Ethambutol	Comprimé pelliculé		Les comprimés peuvent être écrasés et mélangés à l'alimentation ou à une boisson. (Vidal 2012)		1 oui/1 + labo	D'après le RCP : pour les nourrissons, les comprimés seront écrasés et mélangés à l'alimentation ou à une boisson.
Diamicron LM 30mg	Gliclazide	Comprimé à libération modifiée		Ne pas croquer. A administrer au petit déjeuner	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : autres sulfamides hypoglycémiantes : Daonil, Glutril	9 non/10 +labo	S'agissant d'hypoglycémiant mieux vaut avoir recours à l'insuline, risque de variation trop importante de la glycémie
Diamox 250mg	Acétazolamide	Comprimé sécable		A administrer au cours ou en fin de repas avec aliment ou sirop pour masquer l'amertume		8 oui/8	
Diastabol 50 et 100 mg	Miglitol	Comprimé		Possibilité de croquer le cp avec la première bouchée de nourriture au début du repas (RCP 04/04/2012)		1 oui/1 + labo	Il est possible d'écraser les comprimés mais il faut le mettre en suspension dans un liquide et avaler la suspension au début du repas. Aucune donnée par Sonde NG. (04/01/2013)






Dicetel 100mg	Pinavérium	Comprimé pelliculé	 oui mais uniquement si administration par SNG	D'après le RCP "les cps doivent être ingérés sans les croquer, ni les sucer". (RCP du 04/07/2012)	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autres PA: Spasfon lycoc 80 mg ou 160 mg ou suppos, Spasmocalm cp dispersible ou orodispersible,	1 oui/1 + labo	Non recommandé d'écraser les comprimés sauf pour une administration par sonde gastrique (produit abrasif sur la muqueuse oesophagienne). Pas d'étude concernant la modification éventuelle des paramètres pharmacocinétiques quand la forme galénique est modifiée.
Dicodin LP 60mg	Dihydrocodéine	Comprimé à libération prolongée				1 non/1	pas d'info labo mais forme à LP donc impossible
Dicynone 500 mg	Etamsylate	Comprimé		-	Dicynone 250mg/2ml inj à diluer dans de l'eau et à administrer par voie orale	1 non/6 + labo	Le RCP ne le préconise pas // alternative par la forme injectable qui peut être administrée par voie orale après dilution dans un demi verre d'eau
Didronel 200 et 400 mg	Etidronate	Comprimé				1 oui/1 + labo	Les comprimés peuvent être écrasés pour les passer dans une sonde de nutrition entérale ou pour faciliter l'ingestion du comprimé (ne pas dissoudre dans du lait). Toutefois, cet usage n'est pas recommandé car pas d'info concernant l'absorption et la tolérance du Didronel lorsqu'il est écrasé.
Diffu-K 600mg	Potassium chlorure	Gélule		Ne pas écraser le contenu. Eviter la prise simultanée de lait	Potassium Richard en sirop 3% fl 250 ml ou sirop 440mg/15ml en sachet; Gluconate de potassium H3 santé sirop 15g/100ml fl 250 ml	8 oui/9 + labo	Masquer les microgranules de potassium car risque d'ulcération de l'estomac (très délicat) // boire avec un grand verre d'eau // ne pas croquer les microcapsules;
Difrarel 100mg	Myrtille, bêta-carotène	Comprimé enrobé		D'après le RCP 28/09/2011:"les cps sont à avaler sans les croquer, avec un verre d'eau".	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : autres PA: Climaxol goutte buv fl 60 ml; Cyclo 3 fort sol buv (selon indication)	4 oui/4	
Digoxine 0,25 mg	Digoxine	Comprimé sécable		Produit à marge thérapeutique étroite, Prise pendant les repas	Digoxine 50µg/ml, sol buv, fl. de 60ml	7 non/10	pas d'info labo mais possibilité d'alternative par une solution buvable
Di-hydan 100mg	Phénytoïne	Comprimé sécable		Mélanger les cps écrasés à de la nourriture. A administrer toujours à la même heure. Pendant ou après le repas		6 oui/7 + labo	Dans le RCP il est mentionné qu'il est possible d'écraser les cps
Dipiperon 40mg	Pipampérone	Comprimé sécable			Dipiperon solution buvable 40 mg/ml, fl de 30 ml	4 non/5 + labo	Déconseillé car pas d'étude de biodisponibilité des cps écrasés // alternative par la solution buvable 40mg/ml qui a la même indication et posologie que dipiperon 40mg cp
Disulone 100mg	Dapson, Fer	Comprimé sécable		D'après le RCP les cps peuvent être écrasés et mélangés à un liquide ou un yaourt.		3 oui/3	









Ditropan 5mg	Oxybutynine	Comprimé sécable		A prendre à jeun ou au cours des repas avec de l'eau ou du lait.	Ditropan 1 mg/ml sol buv ATU nominative	4 oui/4 + labo	Aucune donnée sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // au niveau galénique le cp étant nu et sécable il peut être écrasé l'oxybutine est soluble dans l'eau . A protéger de la lumière
Dogmatil 50 mg	Sulpiride	Gélule			Dogmatil 200ml solution buvable 0,5mg/100ml sans sucre	4 non/5	pas d'info labo mais possibilité d'alternative par une solution buvable
Dogmatil 200 mg	Sulpiride	Comprimé sécable			Dogmatil 200ml solution buvable 0,5mg/100ml sans sucre	5 non/6 + labo	aucune donnée sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // cp nu // Le PA est pratiquement insoluble dans l'eau // Alternative par une solution buvable à 0,5mg/100ml sans sucre
Doliprane 500 mg	Paracétamol	Comprimé		Très amer. A avaler tels quels avec une boisson (eau, lait, jus de fruit)	Doliprane Sachet, cp effervescent, suppo, cp orodispersible	2 oui/2	
Doliprane 500 mg	Paracétamol	Gélule		Très amer. A avaler tels quels avec une boisson (eau, lait, jus de fruit)	Doliprane Sachet, cp effervescent, suppo, co orodispersible	3 oui/3	
Dopergine 0,2 mg, 0,5mg	Lisuride	Comprimé sécable		Administration immédiate, PA photosensible. Administration au cours du repas ou d'une collation		2 oui/2	
Driptane	Oxybutynine	Comprimé sécable		photosensible - administration extemporanée		5 oui/5	
Duphaston 10mg	Dydrogesterone	Comprimé pelliculé		administration immédiate		3 oui/3	
Duspatalin 200mg	Mébévérine	Gélule		Ne pas écraser les microgranules. Administration avant le repas,		labo	L'ouverture des gélules est possible mais attention il ne faut pas écraser les microgranules. L'administration des microgranules est recommandée avant les repas.
Ebixa 10mg, 20 mg	Mémantine	Comprimé pelliculé		Goût amer, ne pas mélanger avec du pamplemousse. Ecrasement et dissolution dans l'eau possible, administration immédiate (Vidal 2012)	Ebixa 5mg/pression, sol buv fl. de 50ml	4 oui/9+labo	Les cp peuvent être écrasés et dissouts dans l'eau, les caractéristiques de la mémantine ne sont pas modifiées. Il est recommandé d'administrer immédiatement la solution. Le pelliculage masque l'amertume.
Ecazide 50mg/25mg	Captopril; Hydrochlorothiazide	Comprimé sécable				3 oui/3	





Effexor LP 37,5 et 75 mg	Venlafaxine	Gélule à libération prolongée		Ne pas écraser le contenu. Administrer pendant le repas. D'après le RCP 01/02/2012 " les gélules doivent être avalées avec un peu de liquide, et ne doivent être ni coupées, ni écrasées, ni croquées ou dissoutes"		4 oui/9 + labo	Pratique hors AMM donc non recommandée // la forme LP est assurée par diffusion du PA au travers de la membrane des sphéroïdes (diffusion non ph dépendante) // mélanger les microgranules dans un aliment sucré (compote de pommes par ex) // L'aliment sucré doit être avalé immédiatement sans le mâcher et suivi par la prise d'un verre d'eau pour s'assurer que les microgranules sont bien avalés // la pharmacocinétique de la forme LP n'est pas altérée // aucune étude n'a été faite sur SNG mais il est à prévoir que l'efficacité et la biodisponibilité soient inchangées // le calibre de la sonde doit être supérieur ou égal à 14 ou 16 F car sinon les sphéroïdes risquent de boucher les sondes // rincer ensuite la tubulure 2 ou 3 fois pour que les sphéroïdes n'adhèrent plus aux parois
Effortil 5mg	Etiléfrine	Comprimé			Effortil sol buvable 1cp=10gttes fl 30 ml (450 gouttes)	1 non/1	pas d'info labo mais possibilité d'alternative par une solution buvable
Elavil 25mg	Amitriptyline	Comprimé pelliculé			Laroxyl 40mg/ml sol buvable	1 non/1	pas d'info labo mais possibilité d'alternative par une solution buvable
Elisor 10, 20 et 40mg	Pravastatine	Comprimé sécable		Administration le soir,		5 oui/5	
Emend 80mg et 125mg	Aprépitant	Gélule		Ne pas ouvrir la gélule. Ne pas écraser le contenu		2 non/3	D'après Vidal et Theriaque : La gélule doit être avalée entière. Ce médicament peut être pris avec ou sans aliments.
Emtriva 200mg	Emtricitabine	Gélule			Emtriva 10mg/ml, sol buv, fl. de 170ml	1 non/1 + labo	Les gélules sont normalement réservées aux patients qui peuvent avaler. Emtriva est disponible sous forme de solution buvable à 10mg/ml pour le nourrisson de plus de 4 mois, l'enfant, les patients ne pouvant pas avaler de gélule et pour les patients pour lesquels une adaptation de posologie est nécessaire. La solution buvable peut être directement administrée dans une sonde. La posologie recommandée de la solution buvable d'Emtriva est chez les patients adultes, de 240mg (24ml) une fois par jour.
Endotelon	Extrait de pépin de raisin	Comprimé gastro-résistant			Sur avis médical : Cyclo 3 fort amp buv; Cémaflavone amp buv; Mediveine sachet, Diovenor sachet, Ginkor fort sachet; Veinamitol sol buv...	2 non/2	
Endoxan 50mg	Cyclophosphamide	Comprimé pelliculé		 produit cytotoxique. Le matin à jeun Ne pas croquer.		2 non/2	
Entocort 3 mg	Budésonide	Gélule contenant microgranules gastrorésistantes		Ne pas écraser, ni mâcher les granules, Avec jus d'orange ou coca		1 oui/2 + labo	Elles peuvent être ouvertes mais ne doivent pas être ni croquées, ni mâchées

Epitomax 100mg	Topiramate	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer, ni couper	Epitomax 15mg, 25mg et 50mg, gélules	4 non/4+labo	Existe des gélules qui peuvent être ouvertes
Epitomax 15mg, 25mg, 50mg	Topiramate	Gélule		Ne pas écraser le contenu, le mélanger à un aliment semi-solide et avaler immédiatement sans mâcher		4 oui/4+labo	Peut être ouverte et mélangée dans nourriture. Mélange alimentation médicament doit être immédiatement avalé sans être mâché. Ne pas conserver le mélange pour utilisation ultérieure
Epivir 150mg et 300mg	Lamivudine	Comprimé pelliculé			Epivir 10mg/ml, sol buv, fl. de 240ml	5 non/5	Les comprimés ne doivent pas être écrasés. Néanmoins en recours ultime, possibilité d'écraser les cp et de les mélanger à une petite quantité de nourriture semi-solide ou de liquide, le tout devant être ingéré immédiatement (RCP 11/07/2012)
Ercefuryl 200 mg	Nifuroxazide	Gélule		La poudre est insoluble dans l'eau, la mélanger dans un aliment semi liquide: yaourt, purée ou compote		1 oui/3 + labo	Aucune donnée sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // D'un point de vue galénique, il est possible d'ouvrir les gel mais le produit est insoluble dans l'eau. Il est préférable de mélanger extemporanément le PA à un aliment semi solide (yaourt, compote, purée...) // attention: nouvelle présentation d'Ercefuryl, boîte de 12 gel exclusivement réservé à l'adulte (à partir de 15 ans)
Erythrocline 500 mg	Erythromycine	Comprimé pelliculé		Prise avant le repas	Erythrocline granulés pour sol buv à 1000 mg et à 500mg ; Abboticine susp buv 200mg/5ml fl 60 ml;	2 oui/2	
Esidrex 25mg	Hydrochlorothiazide	Comprimé sécable		gout désagréable, administration extemporanée		8 oui/8+ labo	Aucune donnée // ce n'est pas une forme LP ni gastro-résistante // risque de perte de PA au moment du broyage// le cp broyé est à adm sur un aliment semi-solide et surtout ne pas dissoudre au préalable.
Espéral 500mg	Disulfirame	Comprimé		Avaler le matin avec un demi verre d'eau.		1 oui/1 + labo	Aucune étude spécifique réalisée avec les cps d'ESPERAL écrasés. Il existe sur le comprimé, une "croix" dite croix de "fantaisie" pouvant permettre au patient de couper le comprimé avant de le prendre.
Eskazole 400mg	Albendazole	Comprimé		Adm au moment des repas, les cp peuvent être croqués	Zentel 0,4g/10ml susp buv fl 10ml	2 oui/2	
Estracyt 140mg	Estramustine	Gélule		 Produit cytotoxique: ne pas ouvrir, ni écraser, ni croquer		1 non/1 + labo	D'après le RCP les gélules doivent être avalées entières avec un peu d'eau. En aucun cas, elles ne doivent être ouvertes, sucées mâchées ni même mordues. L'estramustine est irritant et ne doit pas rentrer en contact avec la muqueuse oesophagienne.
Eulexine 250 mg	Flutamide	Comprimé sécable				3 oui/3	








Eupantol 40 mg	Pantoprazole	Comprimé gastro-résistant			Sur avis et prescription médicale : Autre IPP: Inexium 10mg sachet; Ogastoro cp orodispersible; Zoltum gélule à ouverture possible mais ne pas écraser les microgranules	2 non/2	
Euphylline 50mg, 100mg, 200mg, 300mg et 400mg	Théophylline	Gélule LP		et avaler avec un aliment liquide ou semi-liquide (yaourt ou compote), immédiatement après le mélange, en veillant à ce que les microgranules ne soient pas croqués. (Vidal 2012)	Dilatrane 10mg/ml, sirop, fl; de 200ml; Dilatrane 350 mg suppo; Pneumogéine 1% sirop	7 oui/7	
Eupressyl 30 et 60mg	Urapidil	Gélule		Ne pas écraser le contenu, sans trop remuer, administration immédiate car libération du PA dans l'eau		7 oui/9 + labo	Forme galénique retard // pas de données galénique permettant de recommander l'ouverture des gélules
Eurelix LP 6mg	Pirétanide	Gélule		Ne pas écraser le contenu, ni croquer		5 oui/5	
Eurobiol 25 000u	pancréas d'origine porcine	Gélule contenant des microgranules gastro-résistants		D'après le RCP 2011: ouverture possible, mais ne pas croquer les microgranules. Les administrer dans un milieu non alcalin (jus d'orange par exemple)	Eurobiol 12 500U/dose, fl. de 20g	2/3 + labo	ouverture possible mais dissoudre dans quelque chose d'épais, de consistant (pas dans du liquide)
Euthyral 20µg/100µg	lévothyroxine sodique, liothyronine	Comprimé sécable		le matin à jeun		1 non/1 + labo	il est possible d'écraser les comprimés mais n'ayant pas de donnée de stabilité après broyage, ceci est à faire de manière extemporanée.
Exacor 130 mg	Cibenzoline	Comprimé pelliculé sécable		-		2/2+labo	Le pelliculage n'est pas un film gastro-résistant mais il permet une meilleure identification et une meilleure opération de conditionnement.
Exacyl 500 mg	Acide tranexamique	Comprimé pelliculé		utilisation de la forme buvable	Exacyl sol buv 1g/10ml ampoules à administration immédiate	2 non/2	
Exelon 1,5mg, 3mg, 4,5mg et 6 mg	Rivastigmine	Gélule		Ne pas écraser le contenu. A administrer au cours ou en fin de repas.	Exelon 4,6mg/24h, 9,5mg/24h, dispositif transdermique. Exelon 2mg/ml sol buv fl 50 ml	8 non/8	
Extranase 900nk	Bromélaïnes	Comprimé gastro-résistant		Ne pas croquer		3 non/3	
Ezetrol 10mg	Ezetimibe	Comprimé enrobé		-		2 oui/3 + labo	Aucune donnée sur biodisponibilité stabilité et efficacité sur administration après écrasement donc non recommandé








Fansidar 500mg/25mg	Sulfadoxine, Pyriméthamine	Comprimé quadrisécable		Administration extemporanée		1 oui/1 + labo	Il est précisé dans le RCP que "chez les enfants de moins de 6 ans, en raison des risques de fausse route liés à la forme pharmaceutique, les comprimés devront être préalablement écrasés avant d'être donnés". Les comprimés écrasés devront être utilisés extemporanément et ne pourront donc pas être conservés pour une utilisation ultérieure,
Farlutal 500mg	Medroxy -progesterone	Comprimé sécable		D'après le RCP 01/12/2011: " Les cp sont à avalé avec de l'eau avant les repas"		1 oui/1 + labo	Aucune étude n'a été menée pour évaluer la pharmacocinétique, la stabilité, l'efficacité ou la tolérance après ouverture des gélules et mélange du contenu dans de l'eau ou dans d'autres diluants (compote de pomme, autres aliments). Pas de recommandations de la part du labo.
Feldene 10 et 20mg	Piroxicam	Gélule			Feldene 20mg comprimé dispersible ou suppos		D'après le RCP les gélules sont à avaler telles quelles avec un grand verre d'eau au cours d'un repas.
Femara 2,5 mg	Letrozole	Comprimé pelliculé				1 oui/3 +labo	Aucune donnée // ce n'est pas une forme LP ni gastro-résistante // risque de perte de PA au moment du broyage// le cp broyé est à adm sur un aliment semi-solide et surtout ne pas dissoudre au préalable.
Flagyl 250mg, 500mg	Métronidazole	Comprimé pelliculé		-	Flagyl 125mg/5ml, susp buv, fl. de 120ml	6 oui/7+labo	Il n'y a pas lieu d'écraser car existe une alternative flagyl en suspension buvable // aucune donnée sur cps écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques
Flecaïne 100mg	Flecaïnide	Comprimé sécable		-		8 oui/9 + labo	Aucune donnée de pharmacocinétique donc déconseillé
Flécaïne LP 50mg, 100mg, 150mg et 200mg	Flecaïnide	Gélule de microgranules à libération prolongée		Ne pas écraser le contenu		6 oui/6 + labo	Gélules peuvent être ouvertes pour avaler sans croquer les microgranules car elles sont LP
Flodil LP 5mg	Felodipine	Comprimé enrobé à libération prolongée		Ne pas diviser, croquer ni mâcher	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : autres inhibiteurs calciques : Isoptine, Amlodipine, Loxen, Nifédipine 20mg/ml sol buv en ATU nominative , Unicordium	5 non/5	
Floxyfral 50 et 100 mg	Fluoxamine	Comprimé pelliculé		D'après le RCP 14/02/2012: "les cps doivent être avalés avec de l'eau sans être croqués".	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autre PA: Deroxat susp buv 2mg/ml fl 150ml; Seroplex 20mg/ml sol buv fl 15 ml (attention aux demi-vies)	5 oui/5	
Flucortac 50 µg	Fludrocortisone	Comprimé sécable		D'après le RCP "Chez l'enfant de moins de 6 ans, les cp seront écrasés et dissous dans du jus de fruit ou de l'eau à température ambiante, puis mélangés et administrés immédiatement"			










Fludex 2,5mg	Indapamide	Comprimé pelliculé				1 oui/1 + labo	Peut être administré en suspension après broyage, la cinétique sera peu modifiée
Fludex LP 1,5mg	Indapamide	Comprimé pelliculé à libération prolongée		Ne pas croquer. Administrer le matin avec de l'eau.	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : autres diurétiques hypokaliémiants : Lasilix buv, Esidrex, Tenstaten	10 non/10	
Fludrocortisone 10µg et 50µg	Fludrocortisone	Comprimé sécable		administration extemporanée, les cp peuvent être écrasés et dissous dans du jus de fruit ou de l'eau (RCP 18/04/2012)		7 oui/7	
Fluvermal 100mg	Flubendazole	Comprimé sécable		A administrer au cours ou en fin de repas	Fluvermal 100mg/5ml susp buvable fl 30ml	3 oui/5 + labo	oui mais Alternative par une forme buvable
Folinoral 5 et 25 mg	Calcium folinate	Gélule				labo	Il s'agit d'une forme à libération immédiate (aucun artifice galénique particulier) donc il n'y a pas de problème pour ouvrir la gélule. Il n'est pas impossible d'utiliser le contenu des gélules pour une administration par sonde gastrique. Néanmoins la poudre pourrait adhérer à la tubulure, il faut donc la diluer préalablement dans un support neutre (eau pour préparation injectable par exemple)
Fortzaar 100mg/12,5mg et 100mg/25mg	Hydrochlorothiazide, losartan	Comprimé pelliculé		Mise en suspension extemporanée		1 oui/3 + labo	Aucune étude. Le PA est soluble dans l'eau et est non photosensible.
Fosamax 10 et 70mg	Acide alendronique	Comprimé		Ne pas laisser fondre dans la bouche. Ne pas sucer. Ne pas croquer. A jeun le matin au moins 1/2 heure avant l'absorption des premiers aliments avec un grand verre d'eau. Avaler en position assise ou debout, ne pas s'allonger pendant au moins 30 minutes après la prise du comprimé.	Sur avis et prescription médicale : autre médicament agissant sur la minéralisation osseuse : Protelos 2g granulés pour susp buv en sachet	7 non/7	
Fosavance 70mg/2800 UI et 70mg/5600 UI	Acide alendronique, colécalciférol	Comprimé		Ne pas écraser, sucer ou croquer. PA irritant pour les muqueuses buccale et oesophagienne. Prise 30 minutes avant l'absorption des 1 ^{er} aliments, boissons ou médicaments avec un verre d'eau en position assise ou debout		4 non/4	
Fozitec / fosinopril / foziretic 10mg et 20mg	Fosinopril	Comprimé sécable		Administrer en dehors ou au cours d'un repas.		7 oui/7 + labo	Possible de broyer les cps // n'ayant pas de donnée de stabilité après broyage ceci est à faire de façon extemporanée.









Fucidine 250mg	Acide fusidique	Comprimé pelliculé		PA amer, administration immédiate	Fucidine 50mg/ml, susp buv, fl. de 50ml	4 oui/7 + labo	Pelliculage car goût amer; le mélanger avec un liquide sucré et administrer immédiatement. Ne pas mélanger à du lait. Alternative en suspension buvable.
Fumafer 66mg	Fumarate ferreux	Comprimé pelliculé		Pour limiter les effets indésirables, fractionner la dose en plusieurs prises.	Fumafer poudre orale 33mg/ g	6 oui/10 + labo	aucune donnée sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // alternative par la poudre orale
Furadantine 50mg	Nitrofurantoïne	Gélule		A administrer pendant le repas - Administration extemporanée	Furadantine ou Nitrofurantoïne 5mg/ml sol buv en ATU nominative	6 oui/6	
Gabacet 400mg	Piracétam	Gélule		Ne pas ouvrir ni les croquer	Gabacet 1,25g amp buv	2 non/2	
Gardenal 10, 50 et 100mg	Phénobarbital	Comprimé		A administrer toujours à la même heure	Kaneuron 1mg/goutte sol buv	11 oui/11	En raison du risque de fausse route chez les enfants, le cp sera écrasé et mélangé aux aliments.(info 2011)
Glibenese 5mg	Glipizide	Comprimé sécable		prise juste avant le repas		4 oui/4	
Glimépiride 1, 2, 3 et 4mg	Glimépiride	Comprimé		D'après le RCP 2012 "les cp sont à avaler entiers avec un peu de liquide" Ne pas croquer ni écraser	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : autres sulfamides hypoglycémiantes : Daonil, Glutril	1 non/2+labo	Aucune donnée ne permettant d'écraser les cps
Glivec 100mg	Imatinib	Comprimé enrobé sécable		 Produit cytotoxique, au cours du repas. D'après le RCP 29/03/2012 "possible de dispenser les cp dans un verre d'eau minérale ou de jus de pomme" Administration immédiate		2 non/2	
Glucophage 500mg, 850mg et 1000mg	Metformine	Comprimé pelliculé (sécable pour le 1000mg)		Administration extemporanée, A administrer en cours ou en fin de repas.D'après Theriaque 2011" Ne pas croquer ni écraser"	Glucophage poudre pour solution buvable à 500, à 850 et à 1000mg en sachets	7 non/9+labo	Goût très amer de la metformine masqué par le pelliculage. N'ayant pas de donnée de stabilité après broyage ceci est à faire de façon extemporanée. // cette spécialité est disponible sous forme de poudre pour suspension buvable en sachet-dose
Glucor 50 et 100mg	Acarbose	Comprimé (sécable pour le 100mg)		Administrer au début d'un repas avec de l'eau ou en croquant le cp avec les 1e bouchées		8 oui/8	
Gutron 2,5mg	Midodrine	Comprimé		Principe actif photosensible à Administration immédiate, mélange aqueux seulement, prise avant le repas (de préférence avant le lever), ne pas associer à une alimentation riche en lipides		5 oui/7 + labo	non recommandé par le labo car absence de donnée pharmacocinétique // pas d'AMM pour ce mode d'administration














Gynergène caféiné 1mg/100mg	Caféine, Ergotamine	Comprimé			Sur avis et prescription médicale : autre PA: Imigrane pulvérisation nasale à 10mg/0,1ml ou 20mg/0,1ml en ampoules		Aucune étude clinique n'a été menée sur l'utilisation de ces médicaments une fois les cp écrasés et aucune donnée à ce sujet dans l'AMM, Donc pas de garantie sur la qualité et l'efficacité de cette spécialité lors d'une telle utilisation (08/11/12)
Haldol 1 et 5mg	Halopéridol	Comprimé		Ne pas croquer ni écraser. Ne pas mâcher. Avaler avec de l'eau.	Haldol 2mg/ml, sol buv en gouttes, fl. de 15ml	9 non/9	
Halfan 250 mg	Halofantrine	Comprimé sécable		en dehors du repas (éviter les repas riches en graisses)	Halfan susp buv 100mg/cuil mesure, fl 45 ml	2 non/2	
Havlane 1mg	Loprazolam	Comprimé sécable		Administrer le soir avant le coucher.		4 oui/4	
Hemi daonil 2,5mg	Glibenclamide	Comprimé sécable				3 oui/6 + labo	aucune donnée sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // forme à libération immédiate
Hemigoxine nativelle 0,125mg	Digoxine	Comprimé		D'après le RCP 22/02/2012 "les cp sont à avaler avec un peu d'eau". Marge thérapeutique étroite, préférer la forme buvable	Digoxine 60ml 5µg/0,1ml solution buvable	5 non/8	pas d'info labo mais possibilité d'alternative par une forme buvable
Hepsera 10mg	Adefovir	Comprimé	 Uniquement par SNG	Goût désagréable		1 oui/1 + labo	Les données de pré-formulation du produit permettent d'envisager la dissolution du comprimé d'Hepsera dans 100 ml d'eau pour administration immédiate (aucune étude n'a été faite pour garantir la stabilité de la solution) par sonde gastrique uniquement en raison du goût du produit obtenu.
Heptamyl 187,8mg	Heptaminol	Comprimé			Heptamyl 30,5%, sol buv, fl. de 20ml (1 cp = 15 gouttes)	8 non/10 + labo	aucune donnée sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // Il n'y a pas lieu d'écraser les cps dans la mesure où il existe une alternative par une solution buvable 30,5%
Hexaquine 120mg/32mg	Quinine, Thiamine	Comprimé enrobé		le soir au coucher	Hexaquine suppos	5 oui/5	
Hexastat	Altrétamine	Gélule		 produit cytotoxique D'après le RCP "les gélules ne doivent pas être ouvertes. En effet, la poudre est irritante et ne peut être manipulée qu'avec précaution; il faut éviter tout contact avec		2 non/2	
Hydergine	Dihydroergotoxine	Comprimé sécable		D'après le RCP 2012 "avalé le cp avec de l'eau"	Hydergine 1mg/ml solution buvable en gouttes, prise avant le repas	1 non/1	pas d'info labo mais alternative possible par une solution buvable en gouttes

Hydrea 500mg	Hydroxycarbamide	Gélule		 Produit cytotoxique. Ne pas faire manipuler par femme enceinte se protéger avec gants et masque; adm. aussitôt après la mise en suspension		5 oui/7 + labo	Dans l'AMM// la gélule peut être dispersée dans un verre d'eau et ingérée immédiatement. Il est normal que certains excipients non solubles persistent en surface.
Hydrocortisone 10mg	Hydrocortisone	Comprimé sécable		mélanger avec un aliment		9oui/9	
Hyperium 1mg	Rilménidine	Comprimé		administration immédiate, prise juste avant le repas		9oui/9 + labo	Peut être administré en suspension après broyage, la cinétique sera peu modifiée
Hytacand 8 et 16 mg	Candésartan, Hydrochlorothiazide	Comprimé		Administrer au cours ou en dehors d'un repas.		6oui/6	
Hyzaar 50mg/12,5mg	Hydrochlorothiazide, losartan	Comprimé pelliculé		Mise en suspension extemporanée, Administrer au cours ou en dehors d'un repas. D'après le RCP 10/05/2012 "les cp doivent être avalés avec un verre d'eau"		2 oui/4 + labo	Aucune étude. Le PA est soluble dans l'eau et est non photosensible.
Ibuprofène 200, 400mg	Ibuprofene	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer. Ne pas sucer. Administrer au cours d'un repas. Goût amer	Advil 20mg/ml, susp buv, fl. de 200ml, Sur avis du prescripteur et adaptation de la posologie, Advileff 200mg cp effervescents.	3 non/5 + labo	Pas de recommandations ni d'études faites, le broyage est considéré comme une utilisation hors AMM.
Icaz LP 2,5 mg, 5mg	Isradipine	Gélule		Ne pas écraser le contenu. Les gélules doivent être avalées intactes.	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autres inhibiteurs calciques : Isoptine, Amlodipine, Loxen, Nifédipine sol buv, Unicordium	5non/5	
Idarac 200mg	Floctafénine	Comprimé sécable		Possibilité de delayer dans de l'eau		2oui/2	
Ikorel	Nicorandil	Comprimé sécable		Ne pas ouvrir la plaquette au niveau de la bande de couleur.		3oui/3	
Imigrane 50mg	Sumatriptan	Comprimé pelliculé		Les cp peuvent être dissouts dans un peu d'eau mais goût amer RCP du 25/01/2012	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Imigrane 10 ou 20mg, solution nasale, amp 0,1ml	3 non/4 + labo	
Imodium 2mg	Lopéramide	Gélule		Ne pas écraser le contenu	Imodium 0,2mg/ml sol buv, fl. de 90ml; Imodiumlingual lyc 2mg	2 oui/7+labo	Gélules non gastrorésistantes donc possibilité de les ouvrir
Imovane 3,75 et 7,5mg	Zopiclone	Comprimé enrobé sécable		Administrer le soir avant le coucher.PA photosensible, goût amer		9 oui/9+labo	Aucune donnée sur les cps écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // d'un point de vue galénique les cps sont pelliculés









Imurel 25mg et 50mg	Azathioprine	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer, ni écraser.  Produit cytotoxique. Au cours du repas		5non/5	
Indocid 25mg	Indométacine	Gélule		A administrer au milieu du repas	Indocid 100mg, suppositoires	6non/6	
Inexium 20mg et 40mg	Esoméprazole	Comprimé gastro-résistant		Ne pas croquer. Possible de diluer le cp dans de l'eau ou de l'administrer par une SNG	Inexium granulés gastro-résistants pour suspension buvable en sachet-dose. Ogastoro 15mg et 30mg, comprimés orodispersibles	10non/10	les comprimés peuvent aussi être dispersés dans un demi-verre d'eau non gazeuse. Aucun autre liquide ne doit être utilisé car l'enrobage entérique peut être dissous. Remuer jusqu'à délitement des comprimés et boire la solution avec les granules immédiatement ou dans les 30 minutes. Rincer le verre avec un demi-verre d'eau et le boire. Les granules ne doivent pas être mâchés ni croqués. Pour les patients ne pouvant pas avaler, les comprimés peuvent être dispersés dans de l'eau non gazeuse et administrés par sonde gastrique.
Inipomp 20mg, 40 mg	Pantoprazole	Comprimé gastro-résistant			<u>Sur avis et prescription médical</u> : préférer l'inexium granulés gastro-résistants pour suspension buvable en sachet-dose	2non/2	
Inspra 25 et 50mg	Eplerenone	Comprimé pelliculé		D'après Theriaque aout 2012: "ne pas croquer ni écraser"		1 non/1 + labo	En l'absence de donnée pharmacocinétique comparant la bioéquivalence entre différents modes d'administration et en l'absence de donnée d'efficacité, de stabilité et de sécurité des cps coupés, broyés ou écrasés, le labo ne recommande ni ne suggère la coupure des comprimés en deux, leur broyage ou leur écrasement pour une reconstitution en gélules ou une administration par SNG.
Invirase 500mg	Saquinavir	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer. A administrer au cours ou dans les 2 heures après le repas,		1 non/1 + labo	D'après le RCP : Les comprimés d'Invirase doivent être avalés entier; Invirase doit être pris en même temps que le ritonavir pendant ou après les repas.
Invirase 200mg	Saquinavir	Gélule		D'après le RCP 2012 "Seize des 18 enfants ne pouvaient pas avaler les gélules et ont reçu leur traitement après ouverture des gélules et mélange de leur contenu avec différents véhicules."		2 oui/2 + labo	D'après le RCP : Les gélules d'Invirase doivent être avalées telles quelles; Invirase doit être pris en même temps que le ritonavir pendant ou après les repas.

Iperthen 10 mg, 20 mg	Manidipine	Comprimé		D'après le RCP 18/04/2011: "les cps doivent être avalés, le matin, après le petit-déjeuner, sans les croquer avec un peu de liquide". Eviter le jus de pamplemousse		1 non/1 + labo	La galénique ne s'oppose pas à l'écrasement toutefois le labo ne le recommande pas car aucune étude n'a été faite.
Isoprinosine 500 mg	Inosine acédobéne dimépranol	Comprimé sécable				1 oui/1 + labo	D'un point de vue galénique le cp étant nu et sécable, il peut être écrasé en cas de nécessité, mais aucune étude spécifique n'a été réalisée avec les cps d'ISOPRINOSINE écrasés.
Isoptine 40mg	Verapamil	Comprimé enrobé		A administrer au cours ou en fin de repas		11oui/11	
Isoptine 120mg	Verapamil	Gélule		A administrer au cours ou en fin de repas		9oui/9	
Isoptine LP 240mg	Verapamil	Comprimé pelliculé sécable		A administrer au cours ou en fin de repas	Isoptine 40 mg ou 120 mg	9non/9	
Isorythm LP 125mg	Disopyramide	Gélule		Ne pas écraser le contenu.		2oui/2	
Ixel 25mg et 50mg	Milnacipran	Gélule		A administrer au cours du repas		8oui/8	
Ixprim 37,5mg/325mg	Paracétamol, Tramadol	Comprimé pelliculé		Utilisation extemporanée, Goût amer. D'après RCP 05/08/2011: les cps doivent être avalés tels quels, avec un liquide, sans être ni fractionnés, ni mâchés.	Ixprim 37,5mg/325mg comprimé effervescent	4 oui/6 + labo	Aucune étude n'a été réalisée, Il est possible d'écraser le cp si trouble de la déglutition, la poudre obtenue étant amère, il est conseillé de la mélanger à un aliment semi-liquide (yaourt par ex), La forme effervescente est à privilégier chez ce type de patient. Chez les patient sous SNG il est conseillé de dissoudre le cp écrasé dans une solution aqueuse sachant que le tramadol est hydrosoluble et que le paracétamol ne l'est que partiellement, La forme effervescente pourra être plus intéressante même si aucune donnée, Risque de diminution de l'absorption si sonde duodéno-jéjunale car les 2 PA sont absorbés au niveau de la partie haute du jéjunum
Izilox 400mg	moxifloxacine	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : autres quinolones 2 ^{ème} G : Ofloset, Ciflox susp buv 500mg/ml fl 86ml	4non/4	
Januvia 100mg	Sitagliptine	Comprimé pelliculé		D'après Theriaque 23/04/2012 "Ne pas croquer ni écraser"		2 non/2 + labo	Aucune donnée sur biodisponibilité stabilité et efficacité sur administration après écrasement donc non recommandé
Josir LP 0,4 mg	Tamsulosine	Gélule contenant des microgranules à libération prolongée		Ne pas écraser le contenu (microgranules LP), en fin de repas		3 oui/4 + labo	Pas de donnée sur la cinétique et l'efficacité clinique sur l'ouverture des gélules, Les microgranules LP ne doivent pas être écrasés









Kaleorid LP 600mg et 1000mg	Potassium chlorure	Comprimé enrobé à libération prolongée		Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser. En fin de repas.	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Diffu K gélules 600mg; Gluconate de potassium H3 santé, sirop; Potassium Richard sirop 3% fl 250ml ou sachet à 440mg/sachet	4non/4	
Kaletra 200mg/50mg	Lopinavir, Ritonavir	Comprimé pelliculé		A administrer au cours ou en fin de repas. Ne pas mâcher, couper ou broyer	Kaletra 80-20mg/ml, sol buv, fl. de 60ml	6 non/6	
Keal 1g	Sucralfate	Comprimé sécable			Keal 1g ou 2g sachet, Ulcar 1g sachet	1 non/1 +labo	Aucune donnée ne permettant d 'écraser les cps
Keforal 500 mg et 1 g	Céfalexine	Comprimé pelliculé		A prendre en dehors des repas (interaction avec le lait)	Keforal susp buv 250mg/5ml	1 non/1	pas d'info labo mais possibilité d'alternative par Keforal poudre pour suspension buvable
Kepra 250mg, 500mg, 1000mg	Levetiracetam	Comprimé enrobé sécable		Goût amer. D'après le RCP 07/03/2012 "le cp doit être avalé avec une petite quantité de liquide "	Kepra 100mg/ml, sol buv, fl. de 300ml	7oui/7	
Kerlone 20mg	Betaxolol	Comprimé pelliculé sécable		Ne pas croquer, ni écraser	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autres bêta-bloquants sans ASI: Tenormine, Detensiel, Seloken	3 non/7 + labo	aucune étude sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, Le PA est soluble dans l'eau
Ketek 400mg	Telithromycine	Comprimé pelliculé		Ecraser le comprimé, PA très amer, Gout désagréable: dans une cuillère de compote	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autres macrolides : Erythrocline 1000mg sachet, Josacine cp dispersible ou sachet, Zeclar sol buv, Zithromax sol buv, Rulid cp sécable pour susp buv	2 oui/3 + labo	cp pelliculé par un film fin pour masquer l'amertume. Une étude pharmacocinétique conduite chez le sujet sain a conclu à la bioéquivalence entre les cps entiers et cps écrasés, Attention aux possibles reflux très amers si administration par sonde gastrique, Administration possible également chez les patients porteurs de sonde gastrique ou gastrectomisés mais pas de donnée de cinétique
Kivexa 600/300mg	Abacavir, lamivudine	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer, ni écraser	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : (Ziagen 20mg/ml, sol buv, fl. de 240ml) + (Epiriv 10mg/ml, sol buv fl. de 200ml ou	2non/2	
Kredex 6,25mg, 12,5mg et 25mg	Carvedilol	Comprimé sécable		Prise pendant le repas		5 oui/6 + labo	D'après le RCP : les cps doivent être avalés avec un volume de liquide suffisant au moment des repas, pour ralentir la vitesse d'absorption et donc réduire la fréquence de survenue d'hypotension artérielle, en particulier orthostatique, ou de décompensation.
Kytril 1mg et 2mg	Granisetron	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : autre sétron : Zophren 4mg/5ml sirop fl 50ml; Zophren lyc 4 ou 8mg, Zophren suppos 16mg	1 non/1 + labo	Aucune étude
Lacteol 170mg, 340mg	Lactobacillus; milieu de culture	Gélule		-	Lacteol 340mg/sachet	1 oui/2 + labo	oui mais pas d'étude réalisée
Lamalaine	Paracétamol, Opium, Cafeine	Gélule			Lamalaine suppos	1 non/2 + labo	impossible car présence de poudre d'opium, Alternative par la forme suppositoire


Lamictal 2,5,25,50, 100 et 200mg	Lamotrigine	Comprimé dispersible ou à croquer		A administrer toujours à la même heure, pendant le repas		9oui/9	
Lamisil 250mg	Terbinafine	Comprimé sécable		administration extemporanée, photosensible. Au cours du repas		2 oui/2+labo	Aucune donnée // ce n'est pas une forme LP ni gastro-résistante // risque de perte de PA au moment du broyage// le cp broyé est à adm sur un aliment semi-solide et surtout ne pas dissoudre au préalable // PA photosensible
Lamprene 50mg et 100mg	Clofazimine	Capsule molle		Contenu liquide huileux. Au repas ou avec du lait. Ne pas croquer.		2non/2	
Lanvis 40mg	Tioguanine	Comprimé sécable		 Produit cytotoxique		2non/2	
Largactil 25 et 100mg	Chlorpromazine	Comprimé pelliculé sécable		PA photosensible	Largactil 4%, sol buv en gouttes, fl. de 30ml	7 non/9 + labo	aucune étude sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // Il n'y a pas lieu d'écraser les cps pelliculés car il existe une alternative par une solution buvable à 4% // le pelliculage contient de l'oxyde de titane qui a un rôle opacifiant pour protéger le PA qui est photosensible
Lariam 250mg	Mefloquine	Comprimé sécable		Administration extemporanée, les cp peuvent être écrasés et dissous dans de l'eau. Gout amer		3 oui/4 + labo	Il est précisé dans le RCP que "chez les enfants de moins de 6 ans ainsi que chez les personnes ayant des troubles de la déglutition, les comprimés peuvent être écrasés et dissous dans de l'eau", Les comprimés de Lariam ainsi écrasés devront être utilisés extemporanément et ne pourront pas être conservés pour une utilisation ultérieure,
Laroxyl 25mg et 50mg	Amitriptyline	Comprimé pelliculé		-	Laroxyl 40mg/ml, sol buv, fl. de 60ml	4 oui/9 + labo	Aucune étude car alternative par une solution buvable
Lasilix 20mg et 40mg	Furosemide	Comprimé (sécable pour le 40mg)		administration immédiate car photosensible	Lasilix 10mg/ml, sol buv, fl. de 60ml	10oui/10	
Lasilix retard 60mg	Furosemide	Gélule		Ne pas écraser le contenu	Lasilix 10mg/m,l sol buv, fl. de 60ml (ce n'est pas une forme retard)	9oui/9	
Lasilix spécial 500 mg	Furosemide	Comprimé sécable		administration immédiate car photosensible		5oui/5	
Lederfoline 5mg, 15mg, 25mg	Calcium folinate	Comprimé sécable		à diluer dans l'eau		4oui/4	
Leponex 25mg et 100mg	Clozapine	Comprimé sécable				2 oui/2 + labo	Aucune donnée pharmacocinétique entre cp entier et cp écrasé dans alimentation, Présence d'excipients insolubles et mauvais goût de la spécialité, il est conseillé administrer les cps écrasés dans alimentation, Du fait de la potentialisation de l'effet sédatif, il est recommandé de ne pas utiliser d'alcool pour aider à la solubilisation
Lepticur 10mg	Tropatepine	Comprimé		-		10oui/10	







Lercan 10 et 20mg	lercanidipine	comprimé pelliculé (sécable pour le 10mg)		Ne doivent pas être pris avec du jus de pamplemousse. D'après le RCP "Les cp seront administrés avec un peu de liquide, de préférence le matin, avant le petit déjeuner"		3 non/4 + labo	Pas de donnée
Lescol 20mg et 40mg	Fluvastatine	Gélule		Ne pas écraser le contenu	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autres statines : Tahor 10 et 20 mg cp à croquer; Pravastatine...	1 non/1 + labo	Le labo préconise d'avaler les gélules intactes, avec un peu d'eau.
Lescol LP 80mg	Fluvastatine	Comprimé à libération prolongée		Ne pas croquer	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autres statines : Tahor 10 et 20 mg cp à croquer; Pravastatine...	1non/1	Pas d'info labo mais impossible car forme à LP
Lévothyrox 25µg, 50µg, 75µg, 100µg, 150µg et 200 µg	Levothyroxine	Comprimé sécable		A administrer le matin à jeun	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : L-Thyroxine 150µg/ml, sol buv, fl. de 15ml	5 oui/9+labo	Possible de broyer les cps // n'ayant pas de donnée de stabilité après broyage ceci est à faire de façon extemporanée.
Lexomil 6mg	Bromazepam	Comprimé quadrisécable			<u>Sur avis et prescription médicale</u> : autre benzodiazépine: Valium Roche 1% sol buv (demi-vie plus longue); Seresta cp (demi-vie plus courte), Lysanxia 15mg/ml sol buv (demi-vie plus longue)	7 oui/7 + labo	Pas d'info mais coupé en 4, le cp est assez petit
Lioresal 10mg	Baclofene	Comprimé sécable		A administrer au cours des repas, photosensible	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Lioresal 5mg/5ml sol buv ATU nominative	4 oui/4+labo	Aucune donnée // ce n'est pas une forme LP ni gastro-résistante // risque de perte de PA au moment du broyage// le cp broyé est à adm sur un aliment semi-solide et surtout ne pas dissoudre au préalable // PA photosensible
Lipanthyl 145mg et 160mg	Fenofibrate	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer A administrer au cours ou en fin de repas	Lipanthyl 67mg, gélule micronisée	4non/4	
Lipanthyl micronisé 67mg, 200 mg	Fenofibrate	Gélule		Ne pas écraser le contenu. A administrer au cours du repas		6oui/6	
Lodoz 2,5mg et 5mg	Bisoprolol; Hydrochlorothiazide	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : autres bêta-bloquants sans ASI : Tenormine, Detensiel, Seloken	3 non/4+labo	Non conseillé en raison du pelliculage
Logimax LP 5mg/47,5mg	Felodipine, Métoprolol	Comprimé à libération prolongée		D'après le RCP 20/01/2012 " Le cp ne doit pas être broyé ou croqué"		1non/1	pas d'info labo mais impossible car forme à LP
Lopressor 100mg	Metoprolol	Comprimé pelliculé sécable		Pendant ou à la fin du repas		1 oui/1	Aucune donnée // le pelliculage n'est pas en faveur de l'écrasement // le labo ne le recommande pas. (Info 2011)








Lopressor LP 200mg	Metoprolol	Comprimé pelliculé sécable à libération prolongée		Pendant ou à la fin du repas		1/1 + labo	impossible car forme à libération prolongée
Lopril 25 mg, 50mg	Captopril	Comprimé sécable		Prise avant le repas		6oui/6	
Loxapac 25, 50 et 100 mg	Loxapine	Comprimé pelliculé			Loxapac 25mg/ml sol buv fl 30ml	4 non/5 + labo	Cps pelliculés donc leur écrasement et dissolution sont susceptibles de modifier considérablement leur action pharmacocinétique et thérapeutique// alternative par une solution buvable
Loxen 20mg	Nicardipine	Comprimé sécable		A administrer 30min avant le repas. PA photosensible.		4 oui/9 + labo	Possible d'un point de vue galénique, mais aucune donnée quand à la modification éventuelle de la biodispo
Loxen LP 50mg	Nicardipine	Gélule à libération prolongée		Ne pas écraser le contenu.		4 oui/9 + labo	Aucune donnée sur modification absorption et biodisponibilité // gélule classique avec mélange de microgranules à libération lente et rapide
Ludiomil 25mg et 75mg	Maprotiline	Comprimé pelliculé (sécable pour le 25mg)		Risque de modification de la biodisponibilité	Sur avis et prescription médicale : Autre inhibiteur non sélectif de la recapture de monoamine: QUITAXON sol buv 10mg/ml fl 30ml (demi-vie plus courte); SURMONTIL sol buv 1mg/gtte fl 1200 gttes (demi-vie plus courte)	4oui/4	
Lutenyl 3,75 et 5 mg	Nomegestrol	Comprimé (sécable pour le 5 mg)				3oui/3	
Lyrica 25mg, 50mg, 100mg et 300mg	Pregabaline	Gélule		D'après Theriaque mai 2012: "Ne pas ouvrir, croquer ni écraser"		5 oui/7+labo	Absence de donnée suffisante et ce malgré une étude interne: au total bioéquivalence entre gélule intacte et dissolution dans 100 ml d'eau et la prise concomitante d'aliment n'a pas affecté la quantité totale absorbée. Malgré cela l'ouverture des gélules est une modalité d'administration hors AMM
Lysanxia 10mg et 40mg	Prazepam	Comprimé (sécable pour le 40 mg)		Comprimé qui se délite en bouche	Lysanxia 15mg/ml, sol buv en gouttes, fl. de 20ml	4 oui/8 + labo	Pas d'étude sur l'écrasement des cps car alternative par la forme buvable
Lysodren 500mg	Mitotane	Comprimé sécable		Ne pas croquer,  Produit cytotoxique Porter des gants pour manipuler les cp. Prise avec repas riche en graisses		1non/1	pas d'info labo mais impossible car produit cytotoxique
Lysopaine	Cétylpyridinium , Lysozyme	Comprimé à sucer		cp à sucer, à laisser fondre dans la bouche	Pastilles Humex mal de gorge, Solutricine maux de gorge ou Collutoires: Collu-hextril 0,2%; Collunovar 0,11%; Gluconate de chlorhexidine cristers 0.11%; Hexaspray	2 non/2	





Lytos	Acide clodronique	Comprimé pelliculé		Prise à distance des repas (interaction avec le lait)		2non/2	
Mag 2 100mg	Magnesium	Comprimé		D'après le RCP 2012 "les cp doivent être avalés avec un demi-verre d'eau"	MAG 2 sachet 184mg; MAG2 sans sucre ampoule 122mg	1 non/2	pas d'info labo mais alternative possible par une poudre pour solution buvable
Magné B6 48mg/5mg	Magnesium, Pyridoxine	Comprimé enrobé		Ne pas croquer. A administrer au cours du repas	Magnéspasmyl granulés 47,4mg/c mesure; Oromag cp à sucer; Spasmag ampoule 1,2g	1 non/1 + labo	Aucune étude spécifique réalisée avec les comprimés de MAGNE B6 écrasés
Malocide 50mg	Pyriméthamine	Comprimé		-		4oui/4	
Mantadix 100 mg	Amantadine	Capsule molle				3non/3 + labo	Du fait de son contenu pâteux, la capsule ne peut être ouverte. (12/11/12)
Mebeverine 200 mg	Mébévérine	Gélule		A prendre avant les repas, avec de l'eau.	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Spasfon lyc, Débridat sol buv	2 oui/2 +labo	Aucune donnée ne permettant d'ouvrir les gélules
Mecir LP 0,4 mg	Tamsulosine	Comprimé pelliculé à libération prolongée				labo	non
Medrol 100mg	Méthylprednisolone	Comprimé		dissoudre dans l'eau		3/3+labo	Procédé de fabrication permet de le rendre hydrophile : cp facilement dispersible dans l'eau
Medrol 4, 16 et 32mg	Méthylprednisolone	Comprimé sécable				1 oui/1 + labo	Aucune étude n'a été menée pour évaluer la pharmacocinétique, la stabilité, l'efficacité ou la tolérance des cps écrasés ou pilés puis mélangés dans de l'eau ou dans d'autres diluants (compote de pomme, autres aliments). Pas de recommandations de la part du labo.
Megace 160mg	Megestrol	Comprimé		 PA cytotoxique		1non/1	
Meladine 10mg	Methoxsalene	Comprimé		PA insoluble dans l'eau		1 oui/1 + labo	Pas de problème pour l'écrasement des comprimés mais le PA est insoluble dans l'eau,
Mestinon 60 mg	Pyridostigmine	Comprimé enrobé				6oui/6	
Mestinon retard 180mg	Pyridostigmine	Comprimé à libération prolongée				1non/1	pas d'info labo mais forme retard donc impossible
Meteospasmyl 300mg/60mg	Alvérine, Siméticone	Capsule molle		En debut de repas		1non/1 + labo	Pas d'info mais impossible car médicament contenant de l'alvérine (produit anesthésiant donc possibilité de fausse route)
Methergin	Methylergometrine	Comprimé pelliculé				labo	Bien que l'écrasement soit possible sur le plan galénique, le labo ne dispose d'aucune donnée quant à la modification éventuelle de la biodisponibilité. Ce mode d'utilisation, qui ne correspond pas à celui que le labo préconise, reste sous votre entière responsabilité.
Méthotrexate 2,5mg	Methotrexate	Comprimé		 Produit cytotoxique		7non/7	


Metopirone 250mg	Metyrapone	Capsule molle		Contenu liquide huileux. Avaler avec du lait ou après le repas.		1/1 + labo	Il est impossible d'ouvrir les capsules de cette spécialité car la forme galénique ne s'y prête pas.
Mianserine 10mg, 30mg et 60mg	Mianserine	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer. Anesthésique au contact des muqueuses, utiliser rapidement.		4 oui/5+labo	Possible de réduire en poudre le cp ; anesthésique au contact des muqueuses ; administration immédiate est recommandée
Micropakine LP 100, 250, 500, 750 et 1000mg	Acide valproïque; Valproate de sodium	Granulés à libération prolongée (sachets)		ne pas écraser, peut être administré en saupoudrant sur un aliment mou ou une boisson, froid ou à température ambiante (yaourt, jus d'orange, compote...)mais JAMAIS chaud. Rincer le verre avec de l'eau et la boire (résidus). Administration immédiate (RCP 23/04/2012)		1non/1	pas d'info labo mais impossible car granulés à libération prolongée
Mifegyne 200mg	Mifepristone	Comprimé		Administration immédiate		2oui/2	
Mimpara 30mg, 60mg, 90mg	Cinacalcet	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer. Pendant ou après le repas		2non/2	
Minipress 1mg et 5mg	Prazosine	Comprimé sécable		-		1 oui/1 + labo	aucune donnée (12/11/12)
Minisintrom 1mg	Acenocoumarol	Comprimé		Avaler avec un verre d'eau, de préférence le soir		6 oui/7 + labo	Compte-tenu de la marge thérapeutique étroite, le cp ne peut être écraser ou broyé car risque de perte de PA et de d'inefficacité. Ecrasement sous la responsabilité du soignant. (06/11/12)
Miorel 4mg	Thiocolchicoside	Gélule				1 oui/1 + labo	D'après le RCP il faut avaler les gélules avec un verre d'eau. Il faut noter que le PA (thiocolchicoside) est soluble dans l'eau à 99,2%, la poudre contenue dans la gélule est soluble dans l'eau à 97% et il n'y a pas d'interaction avec les aliments connue pour le miorel. De ce fait, l'ouverture de la gélule pour administrer son contenu avec des solutés de nutrition semble être possible.
Mobic 7,5mg et 15mg	Meloxicam	Comprimé (sécable pour le 15mg)		Au cours du repas, avec un liquide	Sur avis et prescription médicale : Autre PA: Brexin cp effervescent (demi-vie plus longue); Feldene suppo ou cp dispersible (demi-vie plus longue), Proxalyoc cp lyoc (demi-vie plus longue); Tilcotil suppo (demi-vie plus longue)	1 oui/1 + labo	Pas de donnée concernant la cinétique et l'efficacité clinique// forme facilitant leur fractionnement et se délitent facilement dans la bouche
Moclamine 150mg	Moclobemide	Comprimé pelliculé sécable		A prendre en fin de repas.		2oui/2	

Modiodal 100 mg	Modafinil	Comprimé		D'après le RCP 13/04/2012: "les cps doivent être avalés en entier".		2oui/2	Non, le labo ne recommande pas l'écrasement des cp; ils doivent être avalés en entier (05/11/12)
Modopar 125mg	Lévodopa, Bensérazide	Comprimé dispersible		Dissoudre dans de l'eau. Agiter avant emploi. Administrer en dehors d'un repas, dans la 1/2 heure qui suit sa préparation (noircissement possible par oxydation).		8oui/8	
Modopar 62,5mg, 125mg et 250mg	Lévodopa, Bensérazide	Gélule		D'après le RCP 17/07/2012 "le patient doit impérativement avaler la gélule entière, sans la croquer ou l'ouvrir." Administration en dehors des repas.	Modopar 125mg, comprimé dispersible	9 non/11 + labo	Aucune donnée de toxicité du contenu des gélules sur la muqueuse gastro-intestinale.(23/11/12)
Modopar LP 125mg	Lévodopa, Bensérazide	Gélule à libération prolongée		D'après le RCP 17/07/2012 "le patient doit impérativement avaler la gélule entière, sans la croquer ou l'ouvrir." Administration en dehors des repas.	Modopar 125mg, comprimé dispersible	7 non/8 + labo	Aucune donnée de toxicité du contenu des gélules sur la muqueuse gastro-intestinale. (23/11/12)
Moduretic 5mg/50mg	Amiloride, Hydrochlorothiazide	Comprimé sécable		gout désagréable, prise à distance des repas		5oui/5	
Mogadon 5mg	Nitrazepam	Comprimé sécable		-		2oui/2 + labo	Eviter d'écraser le cp car il y a échauffement lors de l'écrasement. Aucune étude de stabilité. Si pas d'autre choix, peut être fait mais administration immédiate (07/11/12)
Molsidomine 2mg et 4mg	Molsidomine	Comprimé sécable		Principe actif photosensible à Administration immédiate		3 oui/3+labo	oui // Administration immédiate est recommandée car le PA est photosensible
Monicor LP 20,40 et 60 mg	Isosorbide	Gélule à libération prolongée		Ne pas écraser le contenu (microgranules LP), Administration immédiate. D'après le RCP 20/07/2012 "les gélules doivent être avalées directement sans les ouvrir", et Theriaque: "ne pas croquer, écraser ni ouvrir"		7 oui/9 + labo	L'ouverture de la gélule est possible mais de façon extemporanée pour voie orale ou par SNG. Attention à ne pas écraser les microgranules qui sont à libération prolongée.



Monoalgic LP 100mg, 200mg et 300 mg	Tramadol	Comprimé à libération prolongée		-	Contramal ou Topalgic 100mg/ml sol buv fl. de 10ml; Biodalgic 50mg cp effervescent; Orozamudol 50mg cp orodispersible	2non/2	
Mono tildiem LP 200mg et 300mg	Diltiazem	Gélule à libération prolongée		A avaler rapidement, Ne pas broyer les microgranules gastro-résistants, Prise pendant les repas. D'après le RCP 28/12/2012 "la gélule doit être avalée sans être ouverte, ni croquée"	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : autres inhibiteurs calciques : Amlodipine, Loxen, Nifédipine sol buv, Unicordium	4 oui/8 + labo	aucune étude sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // L'ouverture ne peut être recommandée car c'est une forme LP //La gel contient des microgranules à libération immédiate et des microgranules à LP ce qui permet une rapidité d'action et le maintien de l'efficacité jusqu'à la 24eme heure // En cas de force majeure (déglutition; SNG) la gélule peut être ouverte à condition que la totalité des microgranules soit ingérée. La dissolution dans l'estomac et l'absorption risquent de ce fait d'être légèrement plus rapides
Monozeclar	Clarithromycine	Comprimé pelliculé à libération modifiée		Au cours de repas	Naxy ou Zeclar granulés pr susp buv	2non/2	pas d'info labo mais impossible car forme LP
Mopral 10 et 20mg	Omeprazole	Gélule		Mélanger dans un verre d'eau (rincer et boire l'eau de rinçage) ou avec un aliment acide(jus de fruit, compote de pomme). Administration immédiate. Ne pas croquer les microgranules. RCP du 16/04/2012	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Inexium granulés gastro-résistants pour suspension buvable en sachet-dose, Ogastoro cp orodispersible	5/5 + labo	L'enveloppe de la gélule de MOPRAL est formée de gélatine et sert à contenir les micro-granules eux-mêmes gastro-résistants. Il est donc tout à fait possible d'ouvrir la gélule, ce qui est particulièrement fait pour une administration par sonde gastrique. Toutefois, il ne faut pas écraser les micro-granules afin de conserver leur gastro-résistance.
Moscontin 10, 30, 60, 100 et 200mg	Morphine sulfate	Comprimé enrobé à libération prolongée			<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Oramorph sol buv; SKénan LP sans écraser les granules	1non/1	pas d'info labo mais impossible car forme à libération prolongée
Motilium 10mg	Domperidone	Comprimé pelliculé		avant le repas	Motilium ou Peridys 1mg/ml susp buv fl. 200ml ou Motiliumlingual 10mg, lyophilisat oral, Domperidone cp orodispersible	7 non/9 + labo	Aucune étude réalisée. Le labo ne le recommande pas. Si pas d'autre choix, écrasement possible puis mise en suspension (12/11/12)
Moxonidine 0,2mg et 0,4mg	Moxonidine	Comprimé pelliculé		-		1 oui/1 +labo	Aucune donnée ne permettant d'écramer les cps
Muxol 30 mg	Ambroxol	Comprimé sécable			Muxol 0,3% sol buv fl 180ml	1 oui/2 + labo	Cp peut être écrasé sans modification du PA







Myfortic 180mg et 360mg	Mycophenolate	Comprimé gastro-résistant		Afin de préserver l'intégrité de l'enrobage gastro-résistant, les cp ne doivent pas être écrasés. Dans les situations où il serait nécessaire d'écraser les cp, éviter l'inhalation de la poudre ou le contact direct de la poudre avec la peau ou les muqueuses. (RCP)		1 non/2 + labo	Cps doivent être avalés entiers sans être croqués pour préserver l'enrobage gastro résistant
Myleran 2mg	Busulfan	comprimé pelliculé		 PA ! Toxique. Si écrasement; à faire sous isolateur. D'après le RCP:" Ne pas broyer les cp. Toutes les mesures doivent être prises pr éviter l'effritement des cp" RCP du 04/10/2011		1 non/1 + labo	Non recommandé par le labo, écrasement sous flux laminaire mais aucune donnée sur pharmacocinétique du cp écrasé (05/11/12)
Mynocine 50 et 100mg	Minocycline	Microgranules en gélule		au milieu du repas		1oui/1 + labo	Ce n'est pas une forme à LP. Il est possible d'ouvrir les gélules et d'administrer les microgranules (sans toutefois les écraser), dans un verre d'eau ou dans un aliment mou type compote, yaourt. L'administration doit se faire de façon extemporanée.
Myolastan	Tétrazepam	Comprimé pelliculé sécable		Pelliculage permettant de protéger le PA de l'humidité, PA insoluble dans l'eau. A avaler sans croquer.	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autre myorelaxant: Thiocolchicoside comp	6non/6+labo	Aucune donnée sur les cps écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques mais aussi sur la tolérance // d'un point de vue galénique le pelliculage permet de protéger le tétrazepam de l'humidité // le tétrazepam est insoluble dans l'eau le cp écrasé ne pourra pas se dissoudre totalement
Mysoline 250mg	Primidone	Comprimé sécable		D'après RCP 28/03/2012 "chez l'enfant de moins de 6ans, le cp doit être écrasé avant administration".		4oui/4	
Mytelase 10mg	Ambénonium	Comprimé sécable		Pendant ou en fin de repas		2oui/2	
Nabucox 500mg	Nabumetone	Comprimé pelliculé		D'après RCP "à avaler entiers, sans être croqués ni mâchés, avec un peu d'eau".	Nabucox 1g cp dispersible	labo	Alternative par nabucox 1g forme dispersible
Naftilux 200mg	Naftidrofuryl	Gélule avec microgranules		D'après RCP "avalé la gélule sans la croquer ni l'ouvrir, toujours avec un grand verre d'eau".	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autre PA: Vasobral sol buv fl 50 ml; Hydergine sol buv fl 50ml	1 oui/1 + labo	Les gélules sont à libération modifiée. De ce fait il n'est pas conseillé de disperser le contenu de la gélule dans un élément liquide avant l'administration car cela peut entraîner une modification des caractéristiques du produit.

Naprosyne 250, 500 et 1000mg	Naproxene	Comprimé		D'après le RCP "les cps sont à avaler tels quels, avec un grand verre d'eau, au cours des repas".	Naprosyne 500mg suppositoires	1 non/1 + labo	aucune étude (05/11/12)
Naramig 2,5mg	Naratriptan	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer	Sur avis et prescription médicale : autre triptan : Imigrane 20mg, solution nasale, Zomigoro 2,5mg cp arodispersible, Maxaltlyo 5 ou 10mg lyoc;	2non/2	
Natulan 50mg	Procarbazine	Gélule		 Produit cytotoxique		2oui/2	Ecrasement hors AMM, produit très toxique, donc fortement déconseillé par le labo (04/01/2013)
Navelbine 20mg et 30mg	Vinorelbine	Capsule molle		 Ne pas croquer. Produit cytotoxique		1non/1	pas d'info labo mais produit cytotoxique donc impossible d'ouvrir la capsule
Neo mercazole 5mg et 20mg	Carbimazole	Comprimé				4oui/4	Non recommandé par le labo car pas d'étude sur la qualité de cette utilisation (05/11/12)
Neo-codion	Codeine, Extrait de Grindelia, Sulfogaïacol	Comprimé enrobé		D'après le RCP 15/05/2012 "Avaler avec de l'eau"	Neo-codion sirop adulte / enfant / nourrisson	1 non/1	Non recommandé par le labo car cp enrobé, et aucune donnée. Alternative possible par néo-codion sirop (05/11/12)
Neoral 10mg, 25mg, 50mg et 100mg	Ciclosporine	Capsule molle		Ne pas avaler avec du jus de pamplemousse. D'après le RCP 23/04/2012 "Les capsules peuvent être avalées intactes, ou mâchées (avec un grand verre d'eau)"	Neoral 100mg/ml, sol buv, fl. de 50ml dans une boisson froide (Chocolat, lait, cola, jus de fruit eau minérale gazeuse ou non)	5non/5	
Neuleptil 10mg	Propericiazine	Gélule			Neuleptil 1% ou 4% sol buv en gouttes fl 1200 gouttes		pas d'info labo mais alternative possible par une forme buvable
Neuleptil 25 mg	Propericiazine	Comprimé pelliculé sécable		PA photosensible	Neuleptil 1% ou 4% solution buvable en gouttes	2non/2 + labo	pas d'étude mais alternative par une solution buvable à 1% ou 4%








Neurontin 100mg, 300mg et 400mg	Gabapentine	Gélule		A administrer au cours ou en fin de repas. Amertume. D'après le RCP 02/05/2012 "Avaler en entier avec de l'eau"	Neurontin 250mg/5ml sol buv fl 470 ml en ATU nominative (conservation entre 2 et 8°C)	9 oui/11 + labo	<p>Le labo ne recommande ni ne suggère la modification de l'intégrité galénique des gélules car hors AMM et aucune étude // le précédent RCP précisait que l'ouverture était possible et que le contenu devait être mélangé à un aliment pour cacher l'amertume du PA// une étude faite chez 9 volontaires sains a conclu à une non modification de l'absorption (sauf avec des protéines)après ouverture des gélules. L'ouvrage de Trissel sur la stabilité des formulations composées a examiné une référence étudiant la stabilité d'une suspension buvable, préparée à partir du contenu d'une gélule finement moulu. 2 excipients ont été utilisés pr préparer les susp°: un mélange à parts égales de sirop simple et de méthylcellulose 1%; et un mélange à parts égales de Ora-Plus et Ora-Sweet. Les susp ont été conditionnées ds des flacons en plastiques orange; la stabilité a été comparée pr une conservation à t° ambiante et à 4°C: aucun changement d'aspect ou d'odeur; Perte de 6-7% de gabapentine au bout de 56 jours à t° ambiante, et de 5-6% au bout de 91 jours au frigo.</p> <p>Un manuel de réf porte sur l'adm entérale par SNG; et préconise pr les gélules (Parke-Davis) que le contenu doit être mélangé à 10 ml d'eau et passé ds une sonde NG 8Fr sans obstruction. Pr les autres formes et le générique: aucune donnée. Ce manuel émet des suggestions pr cette utilisation: Verser le contenu de la gélule ds l'eau, immédiatement avant administration. Aucune pause prolongée de l'alimentation n'est requise. Pr l'administration intra-gastrique: Arrêter l'alimentation entérale. Rincer la sonde avec le volume d'eau recommandé. Ouvrir la gélule et verser le contenu ds un pot médicinal. Ajouter 15ml d'eau. Remuer et aspirer avec une seringue appropriée, administrer le médicament par le biais de la sonde. Ajouter 15 ml supplémentaires d'eau ds le pot médicinal; remuer pr vous assurer que la poudre restant ds le pot est mélangée à l'eau. Aspirer le mélange</p>
Neurontin 600 et 800mg	Gabapentine	Comprimé pelliculé sécable		A administrer au cours ou en fin de repas	Neurontin 250mg/5ml sol buv fl 470 ml en ATU nominative (conservation entre 2 et 8°C)	4 non/5 + labo	<p>Utilisation hors AMM du médicament. Le labo ne suggère ni recommande un recours à Neurontin ds une utilisation autre que celle décrite ds le RCP. Aucune étude n'a été faite cependant il y a eu des cas isolés où Neurontin a été administré avec succès à des enfants qui ne pouvaient pas avaler les gélules en entier, en dissolvant le contenu de la gélule ds une petite quantité d'eau. La gabapentine a un goût amer et, là encore ds des cas isolés, des sirops parfumés ont été utilisés pr en masquer le goût. Toute préparation liquide doit être utilisée immédiatement.</p>












Nicobion 500mg	Nicotinamide	comprimé pelliculé		PA à goût amer et très colorant. D'après le RCP 13/03/2012 "Avaler sans croquer avec de l'eau" et Theriaque juin 2012: ne pas croquer, ni écraser		9 oui/10	Aucune étude
Nifluril 250mg	Acide niflumique	Gélule		D'après le RCP "11/01/2012 les gélules sont à avaler telles quelles avec un grand verre d'eau". Pendant le repas.	Nifluril 400mg et 700mg, suppositoires. Autre AINS: Apranax sachet, Feldene 20mg etc...	5 non/6 +labo	Rien ne s'oppose à l'ouverture des gélules car ne sont pas LP ni GR; mais aucune étude de bioéquivalence (biodisponibilité, pharmacocinétique, stabilité). Si on procède à cette préparation, il faut l'administrer de façon extemporanée.
Nilevar 10mg	Norethandrolone	Comprimé sécable				1 oui/1 + labo	Aucune donnée sur les impacts en matière de biodisponibilité ou de pharmacocinétique.
Nimotop 30mg	Nimodipine	Comprimé pelliculé		PA photosensible, Eviter contact PVC, Administration immédiate. D'après le RCP 04/01/2012 "Avaler avec un liquide"		1 non/6 + labo	L'écrasement des cps n'est pas recommandé car la nimodipine est photosensible et il n'existe pas de donnée sur la qualité du médicament lors de son écrasement// Le broyage augmente le risque d'altération // Alternative par une forme IV (05/11/12)
Nisis 40, 80 et 160 mg	Valsartan	Comprimé pelliculé sécable			<u>Sur avis et prescription médicale</u> : autre sartan: Cozaar 2,5 mg/ml poudre et solvant pour susp buv ; Aprovel cp, Atacand cp etc...	1 non/1 + labo	Aucune étude donc non recommandé . Pas de sensibilité à la lumière (05/11/12)
Nisisco 80/12,5mg, 160/12,5mg et 160/25mg	Hydrochlorothiazide, Valsartan	Comprimé pelliculé				1 non/1 + labo	Aucune étude donc non recommandé, non sensible à la lumière.(05/11/12)
Nivaquine 100mg	Chloroquine	Comprimé sécable		Après le repas. Les cp peuvent être écrasés et mélangés dans un yaourt ou du liquide sucré	Nivaquine Sirop 25mg/5ml : flacon de 150 ml	1 oui/2 +labo	Cps peuvent être écrasés et mélangés dans yaourt ou liquide sucré // nivaquine existe sous forme de sirop // aucune donnée de cinétique sous forme écrasée ni pour patient porteur d'une SNG
Nizoral 200mg	Ketoconazole	Comprimé		A administrer au cours du repas. En ATU nominative		1 non/1 + labo	Pas d'étude de biodisponibilité suite à l'administration de comprimés broyés de Nizoral. Il est donc déconseillé de broyer les comprimés.
Nocertone 60mg	Oxetorone	Comprimé pelliculé sécable				labo	aucune étude sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // cp sécable à libération immédiate dont le pelliculage permet de masquer le goût et d'assurer la protection du noyau du cp contre l'humidité et la lumière // si le cp devait être écrasé il conviendrait de procéder dans des conditions had hoc et pour une administration extemporanée // pas de donnée sur une administration par sonde gastrique

Noctamide 1mg et 2mg	Lormetazepam	Comprimé sécable		-		5oui/5 + labo	Il est possible d'écraser les cp et de les dissoudre dans l'eau. (05/11/12)
Nolvadex 10mg et 20mg	Tamoxifene	Comprimé pelliculé (enrobé pour le 20mg)		Administration extemporanée,  protection nécessaire pour cytotoxiques, manipulation interdite chez la femme enceinte, protéger de la lumière		5oui/5	
Nootropyl 800 mg	Piracetam	Comprimé pelliculé		Goût désagréable. D'après le RCP 03/04/2012 : "les cps sont à avaler sans être croqués, avec un peu d'eau".	Nootropyl 20% sol buv fl 125ml ou Nootropyl sol buv 1200mg/ampoule		Possible dans un yaourt ou dans la confiture
Nordaz 7,5 et 15mg	Nordazepam	Comprimé sécable				1 oui/1 + labo	Pas de problème à priori car il s'agit d'une forme à libération immédiate et le cp n'est pas pelliculé mais le labo n'a fait aucune étude sur ce mode d'administration et le PA est insoluble dans l'eau.
Noroxine 400mg	Norfloxacine	Comprimé enrobé		Principe actif amer. Ne pas prendre avec du lait ou des produits laitiers	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autres quinolones 2G : Ciflox sol buv, Oflozet	7 oui/9 + labo	Aucune donnée sur biodisponibilité stabilité et efficacité sur administration après écrasement // cp enrobé car le PA a un goût amer donc déconseillé
Norset 15mg	Mirtazapine	Comprimé pelliculé		Administrer de préférence au cours du repas du soir. D'après le RCP 08/02/2012 "Avaler sans mâcher"	Norset 15mg/ml, sol buv, fl. de 66ml	1 oui/7 + labo	L'écrasement est possible // Il existe une alternative par une solution buvable
Norvir 100mg	Ritonavir	Comprimé pelliculé		Pendant le repas, Ne pas mâcher, ni écraser, ni couper (RCP 17/07/2012)	Norvir 80mg/ml, sol buv, fl. de 90ml (gout amer: mélanger dans du lait chocolaté par exemple)	4 non/4	
Notezine 100mg	Diethylcarbamazine	Comprimé sécable		Loase : 1er jour : 1/32 de comprimé (la dilution sera effectuée par un pharmacien) (Vidal 2012)		1 oui/1 + labo	Le cp de NOTEZINE n'étant pas gastrorésistant, il est possible de l'écraser et de le dissoudre dans l'eau pour une administration extemporanée. Il n'existe aucune étude spécifique réalisée avec le cp de NOTEZINE écrasé. Aucune étude également chez le patient porteur de sonde gastrique. (04/01/2013)
Novatrex 2,5mg	Methotrexate	Comprimé		 Produit cytotoxique. Mesure de protection lors de la manipulation		1 non/1 + labo	Aucune étude réalisée, le labo ne peut donc faire de recommandation// produit cytotoxique, lors de la manipulation, mesure de protection adéquate pour éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
Novonorm 0,5mg, 1mg, 2mg	Repaglinide	Comprimé		Avaler avec de l'eau avant les repas.		6oui/6	

Nozinan 25 et 100mg	Levomepromazine	comprimé pelliculé sécable		A administrer au cours ou en fin de repas	Nozinan 4%, sol buv en goutte, fl.de 30ml	8 non/11 + labo	Aucune étude sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // Il n'y a pas lieu d'écraser les cps dans la mesure où il existe une alternative par une solution buvable à 4%
Odrik 0,5mg, 2mg, 4mg	Trandolapril	Gélule		-		3 oui/3+labo	Aucune donnée sur efficacité et sécurité des gélules ouvertes
Oflozet 200mg	Ofloxacine	Comprimé pelliculé sécable		Dissolution dans du jus de pommes, administration immédiate car sensible à la lumière et l'humidité		9oui/9	
Ogastoro 15mg et 30mg	Lansoprazole	Comprimé orodispersible		Dissoudre dans un peu d'eau ou laisser fondre sous la langue. Attention peut boucher la SNG bien rincer la sonde après administration		2oui/2	
Ogast 15 et 30mg	Lansoprazole	Gélule gastrorésistante		Ne pas écraser les microgranules. Les gélules peuvent être ouvertes et les microgranules mélangés à une petite quantité d'eau, de jus de pomme ou de tomate, ou saupoudrés dans une petite quantité de nourriture non solide (yaourt, compote de pomme) et peuvent être ouvertes et les microgranules mélangés à 40 ml de jus de pomme pour l'administration par sonde nasogastrique.	Ogastoro 15mg et 30mg cp orodispersible (attention peut boucher la SNG bien rincer la sonde après administration)	1 oui/1 + labo	préférer Ogastoro qui est une forme orodispersible. Ogastoro peut également être administré par l'intermédiaire d'une SNG.
Omacor 1g	Acides gras oméga 3	Capsule molle		ne pas ouvrir. Au moment des repas		3/3+labo	Capsules ne doivent pas être ouvertes car risque de modifier la pharmacocinétique et plus précisément la biodisponibilité
Omix LP 0,4mg	Tamsulosine	Gélule avec microgranules gastrorésistants		Administration extemporanée. Ne pas écraser les microgranules. Ne pas croquer les microgranules.		1/1 + labo	Il est possible d'ouvrir la gélule mais il ne faut pas écraser ou croquer les microgranules qui sont à libération prolongée, L'ouverture de la gélule et la mise en solution des granules doit se faire de façon extemporanée, juste avant l'administration. Il est possible de les administrer par une SNG selon le même procédé.
Oracefal 500 mg	Cefadroxil	Gélule		Ne pas ouvrir	Oracéfal 1g comprimé dispersible // Oracéfal poudre pour suspension buvable	1 non/1	pas d'info labo mais alternative possible par une forme buvable ou par une forme dispersible

Oraciline 1 M UI	Phenoxymethylpenicilline	Comprimé sécable		A administrer à jeun	Oraciline 1MUI/10ml, susp buv, fl. de 180ml	3 non/5 + labo	aucune donnée validée ms écrasement possible en suspension ds un liquide sucré, de la compote ou pr administrer par SNG à condition que l'administration soit immédiate.
Orap 1mg, 4mg	Pimozide	Comprimé		Avaler avec de l'eau.	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : autre antipsychotique, exemple : risperdal sol buvable	4 non/5+labo	aucune donnée de biodisponibilité des cps écrasés donc non recommandé // alternative par solution buvable. Si pas d'autre choix, mise en suspension possible (12/11/12)
Orbenine 500mg	Cloxacilline	Gélule		A administrer 30 min avant le repas. D'après le RCP 10/08/2012 "les gélules doivent être avalées sans les ouvrir, avec un verre d'eau".	plus d'alternative sirop depuis le 23/05/2011	8 oui/8	D'après le RCP, les gélules ne doivent pas être ouvertes. De plus, le PA possède un goût et une odeur désagréable qui peut entraîner des nausées et vomissements. (05/11/12)
Orelox 100mg	cefepodoxime proxétil	Comprimé pelliculé		Photosensibilité, Goût désagréable, Prise pendant les repas	Forme pédiatrique : Orelox 8mg/ml, sol buv, fl. de 100ml	3 non/7 + labo	Aucune étude sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // Il n'y a pas lieu d'écraser les cps dans la mesure où il existe une alternative par une suspension buvable 40mg/5ml
Oroken 200mg	Cefixime	Comprimé pelliculé		-	Oroken 40mg/5ml et 100mg/5ml, poudre pr sol buv	7oui/7	
Oxeol 10mg et 20mg	Bambuterol	Comprimé sécable		-		7oui/7	Ecrasement possible mais aucune donnée pour les SNG
Oxycontin LP 5mg, 10mg, 20mg, 40mg, 80mg	Oxycodone chlorhydrate	Comprimé pelliculé à libération prolongée		Stupéfiant, Forme à libération prolongée. D'après le RCP 23/02/2012 "Les comprimés doivent être avalés entiers sans être cassés, mâchés ou écrasés"	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Oxynormo cp orodispersible; Skenan LP	4/4+labo	Intégrité impérieuse car forme LP et aucune alteration doit être apportée (risque de surdosage)
Oxynorm 5mg, 10mg, 20mg	Oxycodone chlorhydrate	Gélule			<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Oxynormo cp orodispersible; Oxynorm 10mg/ml sol buv	1 oui/3+labo	aucune donnée sur la pharmacocinétique ou clinique donc non recommandé bien que l'oxycodone soit hydrosoluble et que la gélule ne serve que de vecteur (sans action a priori sur la cinétique)
Ozidia LP 5 et 10 mg	Glipizide	Comprimé à libération prolongée		Ne pas croquer. Ne pas écraser. Forme à libération prolongée.		1 non/1 + labo	Les comprimés doivent être avalés en entier. Aucune étude n'a été menée pour évaluer la pharmacocinétique, la stabilité, l'efficacité ou la tolérance des cps écrasés ou pilés puis mélangés dans de l'eau ou dans d'autres diluants (compote de pommes, autres aliments). Pas de recommandation de la part du labo.
Paludrine 100mg	Proguanil	Comprimé sécable				1oui/1 + labo	Le dossier d'AMM ne contient pas d'étude spécifique de biodisponibilité ni de stabilité en cas d'écrasement du cp. Dans les "recommandations sanitaires pour les voyageurs 2012" et les "Recommandations pour la pratique clinique 2007" il est spécifié pr la chimioprophylaxie du Paludisme que "avant l'âge de 6 ans, les cp doivent être écrasés".









Pariet	Rabeprazole	Comprimé gastro-résistant		Ne pas croquer, ni écraser. Prise le matin à jeun	Sur avis et prescription médicale : Ogastoro 15mg et 30mg cp orodispersible (attention peut boucher la SNG bien rincer la sonde après administration)	2non/2	
Parkinane LP 2mg et 5mg	Trihexyphenidyle	Gélule à libération prolongée		Ne pas écraser le contenu	Artane 0.1mg/gtte, sol buv en gouttes, fl. de 30ml	6 non/7	Les gélules ne doivent pas être ouvertes, elles contiennent des microgranules LP. Alternative possible par une forme buvable (16/11/2012)
Parlodel 2,5mg	Bromocriptine	Comprimé sécable		Administrer au cours d'un repas.		2 oui/3	Le labo ne peut recommander de broyer les cps, dans la mesure où cela n'est pas validé par l'AMM, et dans la mesure où il peut se produire des phénomènes de surchauffe du comprimé. (Info 2011)
Parlodel 5 et 10mg	Bromocriptine	Gélule		Administrer au cours d'un repas.		1 oui/1	Il est possible d'ouvrir les gélules. Cependant, ne disposant pas d'éléments de stabilité, cette pratique ne peut être envisagée que si la préparation est utilisée de façon extemporanée et, bien entendu, s'il n'y a pas de possibilité de faire autrement. (Info 2011)
Peflacin 400mg	Pefloxacin	Comprimé pelliculé sécable		PA photosensible. Prise au moment des repas		1 oui/1 + labo	Le pelliculage des cps sert à masquer l'amertume et à préserver le produit actif de la lumière. Il est théoriquement possible d'écraser ces cps malgré le pelliculage pour une éventuelle administration par sonde gastrique. Le produit étant sensible à la lumière, l'administration doit être immédiate. Toutefois, il n'y a pas de donnée pharmacocinétique avec les cps écrasés.
Pentasa 500mg	Mesalazine	Comprimé			Pentasa 1g, susp rectale, fl. de 100ml ou Pentasa 1g granules sachet	4non/4 + labo	L'écrasement des cps n'est pas possible en raison d'un enrobage pour libération contrôlée de la substance active sur toute la longueur de l'intestin. Il n'existe pas d'alternative étant donné que les formes rectales sont plutôt réservées aux localisations rectales ou rectosigmoïdiennes basses des poussées légères ou modérées de rectocolite hémorragique.
Pentoxifylline 400mg LP	pentoxifylline	Comprimé pelliculé à libération prolongée		forme LP : ne pas écraser		2 non/2 + labo	Aucune donnée
Periactine 4mg	Cyproheptadine	Comprimé		A administrer le soir		4 oui/4	aucune donnée
Perindopril 2, 4 et 8 mg	Perindopril	Comprimé				2oui/2	aucune donnée donc non recommandé notamment du fait de la fragilité du médicament (mais étude en cours) (12/11/12)
Permixon 160mg	Extrait de serenoa repens	Gélule		goût amer, au moment des repas		3 oui/4	Le labo ne recommande pas l'ouverture des gélules car pas d'étude de cinétique. De plus, cela risquerait d'accroître les troubles digestifs, et ainsi de diminuer l'observance.
Persantine 75mg	Dipyridamole	Comprimé enrobé		Forte amertume et fort pouvoir colorant	Cléridium cp pelliculés sécables	3 oui/6 + labo	Pas de donnée sur la cinétique et l'efficacité chimique sur l'écrasement des cps// enrobage en raison d'une forte amertume et d'un fort pouvoir colorant du dipyridamole.


Phenergan 25 mg	Promethazine	Comprimé enrobé			Phenergan 0,1% sirop (qui peut être utilisé dans le traitement des manifestations allergiques diverses)	1 non/1 + labo	pas d'infos sur la possibilité d'écraser ou non les comprimés
Physiotens 0,2mg, 0,4mg	Moxonidine	Comprimé pelliculé		Le matin, au debut du repas		4oui/4	non recommandé, goût très amer mais possible par SNG (12/11/12)
Pipram fort 400mg	Acide pipemidique	Comprimé enrobé		-		6oui/6	
Pirilène 500mg	Pyrazinamide	Comprimé sécable		-		7oui/7	
Plaquenil 200mg	Hydroxychloroquine	Comprimé pelliculé		Forte amertume du PA. A administrer au cours ou en fin de repas		5 oui/6 + labo	Pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques et sur la tolérance. Les cps sont pelliculés pour masquer la très forte amertume du PA
Plavix 75mg, 300mg	Clopidogrel	Comprimé pelliculé		A administrer à heure fixe, Principe actif sensible à la lumière		11/11	
Plitican	Alizapride	Comprimé sécable			Sur avis et prescription médicale : autre PA: Vogalene 0,1% sol buv fl. 150ml; Vogalene 0,4% sol buv fl 30ml, Vogalene lycoc;	1 oui/1 + labo	Aucune étude spécifique réalisée avec les cps de PLITICAN écrasés.
Pneumorel 80mg	Fenspiride	Comprimé enrobé		prise en début de repas	Pneumorel 0,2%, sirop, fl. de 150ml	3 non/5 + labo	Forme considérée comme LP car cp drageifié donc risque d'accélérer la cinétique et d'exercer un effet pharmacodynamique excessif
Polaramine 2mg	Dexchlorpheniramine	Comprimé sécable		-	Polaramine sirop 0,1mg/ml	1 oui/4 + labo	L'écrasement est possible // Cp sécable // Il existe une alternative par un sirop
Ponstyl	Acide mefenamique	Gélule		D'après le RCP 29/03/2012 "Les gélules sont à avaler telles quelles, avec un grand verre d'eau, au moment des repas"		1 non/1 + labo	Aucune étude n'a été menée pour évaluer la pharmacocinétique, la stabilité, l'efficacité ou la tolérance après ouverture des gélules et mélange du contenu dans de l'eau ou dans d'autres diluants (compote de pommes, autres aliments). Pas de recommandation du labo.
Pradaxa 75, 110 et 150mg	Dabigatran	Gélule		D'après le RCP 12/09/2012 "ne pas ouvrir les gélules, car cela pourrait augmenter le risque de saignement"		labo	pas recommandé d'ouvrir la gélule car aucune étude n'a été réalisée
Praxilene 200 mg	Naftidrofuryl	Comprimé pelliculé		Irritant pour l'œsophage. D'après RCP 15/05/2012 "Avaler les comprimés ou les gélules sans les croquer (ni ouvrir la gélule), toujours avec un grand verre d'eau. "	Sur avis et prescription médicale : autre vasodilatateur peripherique: Sermion gélule; Vasobral sol buv fl 50 ml; Hydergine sol buv fl 50ml (selon indication)	2 non/7 + labo	Non car effet anesthésiant local du naftidrofuryl










Praxinor	Cafedrine; Theodrenaline	Comprimé pelliculé			Sur avis et prescription médicale : Autre PA: Heptamyl sol buvable; Effortil 5mg/10gouttes sol buv fl 30ml(450 gouttes)	1non/1 + labo	il n'est pas possible de broyer les comprimés (cps pelliculés)
Prazinil 50mg	Carpipramine	Comprimé pelliculé				1 oui/1	Le labo ne recommande pas l'écrasement des cps car pas d'étude de cinétique avec la forme écrasée du Prazinil.
Prestole 50mg/25mg	Hydrochlorothiazide; Triamterene	Gélule		diluer la poudre dans de l'eau et boire immédiatement. Prise le matin		5oui/5 + labo	aucune donnée (12/11/12)
Preterax 2mg/0,625mg	Indapamide, Perindopril	Comprimé sécable		A administrer le matin ou avant un repas.		6oui/6 + labo	Peut être administré en suspension après broyage, la cinétique sera peu modifiée
Previscan 20mg	Fluindione	Comprimé quadrisécable		A administrer à heure fixe, changement de couleur mais aucune modification sur l'efficacité, prise pendant le repas, éviter les aliments riches en vit K (brocoli, épinard, choux, asperges..)		10 oui/11 + labo	Pas d'étude, pas recommandé par le labo d'écraser les cp. (12/11/12)
Prezista 75, 150, 300mg	Darunavir	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer.		2non/2	
Primalan 5mg, 10mg	Mequitazine	Comprimé sécable		-	Primalan sirop, fl. de 60ml	2non/2+labo	Risque de modifier la pharmacocinétique et plus précisément la biodisponibilité
Primperan 10mg	Metoclopramide	Comprimé sécable		A administrer 30 min avant le repas	Primperan sol buvable (0,1%, sol buv, fl, de 200ml) ou suppo	5 non/8 + labo	Aucune étude sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // Il existe des alternatives à l'écrasement: chez l'adulte, sirop a 0,1% (nausées et vomissements non induits par les antimotilitiques) ou le suppositoire a 10mg. Chez l'enfant, suppositoire a 10mg si nausées et vomissements induits par les antimotilitiques ou sinon gouttes a 2,6mg/ml
Pritor 20, 40 et 80mg	Telmisartan	Comprimé		cp hygroscopique, administration immédiate après sortie du blister	Sur avis et prescription médicale : autre sartan: Cozaar susp buv, Aprovel...	labo	Les cps ne sont pas sécables // le PA est sensible a l'air et à l'humidite donc le broyage est source d'altération
Pritorplus 40mg/12,5mg , 80 mg/12,5 mg et 80mg/25mg	Telmisartan, Hydrochlorothiazide	Comprimé bicouche		cp hygroscopique, administration immédiate après sortie du blister		labo	Les cps ne sont pas sécables // le PA est sensible a l'air et à l'humidite donc le broyage est source d'altération

Procoralan 5mg et 7,5mg	Ivabradine	Comprimé pelliculé		dissolution possible sauf avec du jus de pamplemousse, pas de mélange avec d'autres médicaments. Prise au moment des repas		4 oui/4+labo	Possible de dissoudre dans un verre d'eau, coca ou jus orange mais exclure jus de pamplemousse ou écraser dans compote mais éviter le lait et/ou le fromage blanc. administration possible après broyage et mise en suspension la cinétique de libération du PA des cps broyés sera peu modifiée le temps de délitement du cp en milieu gastrique artificiel étant inférieur à 30 min // ne pas mélanger poudre procoralan avec med de phytothérapie
Profenid 50mg	Ketoprofene	Gélule		PA photosensible. Theriaque 05/04/12: "Ne pas croquer, ni écraser, ni ouvrir". D'après RCP 14/03/2012 "avalé tels quels avec un grand verre d'eau au cours des repas"	Profenid suppo, Nureflex	2oui/2 + labo	D'un point de vue galénique il est exceptionnellement possible d'ouvrir les gélules // aucune étude sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques donc non conseillé
Profenid 100mg	Ketoprofene	Comprimé pelliculé		PA photosensible. Theriaque 05/04/12: ne pas croquer ni écraser. D'après RCP 14/03/2012 "avalé tels quels avec un grand verre d'eau au cours des repas"	Profenid suppo, Nureflex	2 oui/3 + labo	Aucune étude sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // D'un point de vue galénique il est exceptionnellement possible d'écraser les cps mais l'utilisation doit être extemporanée car le PA est photosensible // Aucune donnée sur l'administration par sonde
Profenid LP 200mg	Ketoprofene	Gélule		PA photosensible Ne pas écraser les microgranules. Theriaque: ne pas ouvrir, ni croquer, ni écraser	Profenid suppo, Nureflex	1 oui/1 + labo	Forme LP assurée par l'enrobage des microgranules contenus dans la gélule et non par la gélule elle-même donc d'un point de vue galénique il est exceptionnellement possible de les ouvrir et d'avalé les granules sans les croquer // Mais aucune étude sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques donc non recommandé // Aucune donnée sur une administration par sonde
Profenid LP 200mg	Ketoprofene	Comprimé enrobé à libération prolongée		Ne pas croquer. A administrer au cours ou en fin de repas	Profenid 100mg, suppositoire	1 non/1	pas d'info labo mais impossible car forme LP
Proglicem 25mg et 100mg	Diazoxide	Gélule		Insoluble dans l'eau. Pour les nourrissons et enfants de moins de 6 ans, le contenu des gélules peut être mélangé à des aliments (Info 2011).		3oui/3	


Prograf 0,5mg, 1mg et 5mg	Tacrolimus	Gélule		prise à jeun. Les gélules doivent être prises immédiatement après sortie de la plaquette thermoformée. Le contenu de la gélule peut être mélangé à de l'eau et administré par sonde nasogastrique (RCP 15/05/2012)		3oui/3	
Propylex 50 mg	Propylthiouracile	Comprimé		RCP 05/09/2012 " Avaler avec un verre d'eau"		labo	Comprimé non sécable
Proracyl 50 mg	Propylthiouracile	Comprimé		 Sous hotte aspirante		labo	Sous hotte aspirante
Prothiaden 25 mg	Dosulépine	Gélule			<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autre inhibiteur non sélectif de la monoamine: LAROXYL sol buv 40mg/ml fl 20ml; QUITAXON sol buv 10mg/ml fl 30ml; SURMONTIL sol buv 1mg/goutte fl 1200 gouttes	2oui/2	
Prothiaden 75mg	Dosulépine	Comprimé enrobé		-	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autre inhibiteur non sélectif de la monoamine: LAROXYL sol buv 40mg/ml fl 20ml; QUITAXON sol buv 10mg/ml fl 30ml; SURMONTIL sol buv 1mg/goutte fl 1200 gouttes	3oui/3	
Prozac 20mg	Fluoxétine	Comprimé dispersible sécable		Ne pas croquer. Administrer au cours ou en dehors des repas.	Prozac 20mg/5ml, sol buv, fl. de 70ml	7oui/7	
Prozac 20mg	Fluoxétine	Gélule			Prozac 20mg/5ml, sol buv, fl. de 70ml; Prozac cp dispersible	1 non/1 + labo	aucune donnée (12/11/12)
Purinethol 50mg	Mercaptopurine	Comprimé sécable		A administrer à jeun.  Produit cytotoxique		2non/2	
Pyostacine 500mg	Pristinamycine	Comprimé pelliculé sécable		mélanger avec un aliment sucré (confiture) ou du lait		10oui/10	
Quinimax 125mg, 500mg	Quinine, Quinidine, Cinchonine, Cinchonidine	Comprimé pelliculé sécable		-		4oui/4	









Rapamune 0,5mg ,1mg et 2mg	Sirolimus	Comprimé enrobé		Ne pas avaler avec du jus de pamplemousse	Rapamune 1mg/ml, sol buv, fl. de 60ml	3non/3	
Rasilez 150 et 300mg	Aliskirene	Comprimé pelliculé		Prise avec un repas léger; éviter le jus de pamplemousse		1 non/1 + labo	Aucune donnée sur la modification éventuelle de l'absorption et de la biodisponibilité. Toutefois, si aucune autre alternative thérapeutique n'est possible, voici quelques informations utiles : ce n'est pas une forme LP ni GR / il y a risque de perte de PA au moment du broyage / le PA a un goût très amer / le cp broyé serait à administrer de façon extemporanée sur un aliment semi- solide (surtout ne pas dissoudre au préalable) / pour la manipulation du produit, vérifier dans le Vidal les données de sécurité pré-clinique / Ce mode d'utilisation reste sous votre entière responsabilité. (06/11/12)
Rebetol 200mg	Ribavirine	Gélule		Prise au moment des repas	Rebetol 40mg/ml, sol buv, fl. de 100ml	1 non/3 + labo	Il est déconseillé de les ouvrir car effets toxiques et tératogènes // Il existe une alternative par une solution buvable
Relpax 20mg et 40mg	Eletriptan	Comprimé pelliculé		D'après le RCP 05/01/2012 "Le comprimé doit être avalé en entier avec de l'eau", Theriaque 25/04/12: "Ne pas croquer, ni écraser"	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : autre triptan : Imigrane 20mg, solution nasale	1 non/1 + labo	Pas de donnée sur la possibilité d'écraser les cps et d'administrer les cps broyés par sonde de nutrition entérale. Le labo ne recommande ni ne suggère l'écrasement des cps en vue de leur administration par sonde.
Reminyl 4mg, 8mg et 12mg	Galantamine	Comprimé pelliculé		Prise avec le petit dejeuner et le dîner	Reminyl 4mg/ml, sol buv, fl. de 100ml	5 non/7+labo	aucune donnée de biodisponibilité donc non recommandé.
Reminyl LP 8mg, 16mg, 24 mg	Galantamine	Gélule		Ne pas croquer, mâcher ou écraser. Prise pendant le repas	Reminyl 4mg/ml, sol buv, fl. de 100ml	4non/4	
Renagel 800mg	Sevelamer	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer. Prise au cours des repas	Renvela sachets pour susp buv à 2,4g	2non/2	
Renitec 5 et 20mg	Enalapril	Comprimé sécable		PA hygroscopique et photosensible, Dégradation du PA en milieu acide		3non/3	
Requip 0,25mg, 0,50mg, 1mg, 2mg, 5mg	Ropinirole	Comprimé pelliculé		administration immédiate, prise pendant le repas		4oui/4	Il n'est pas recommandé de couper ou d'écraser les cp. Pas d'étude ayant évalué la stabilité d'une suspension ou solution de Requip. L'administration de Requip à travers une sonde naso-gastrique n'a pas été étudiée. (14/11/2012)
Requip LP 2mg, 4mg et 8mg	Ropinirole	Comprimé pelliculé à libération prolongée		-	Requip 1mg, 2mg et 5mg comprimé	1 non/1	pas d'info labo mais forme à LP donc impossible d'écraser les cps
Retrovir 100mg et 250mg	Zidovudine	Gélule			Retrovir 10mg/ml, sol buv, fl. de 200ml	5non/5	
Retrovir 300mg	Zidovudine	Comprimé pelliculé			Retrovir 10mg/ml, sol buv, fl. de 200ml	4non/4	

Revatio 20mg	Sildenafil	Comprimé pelliculé		Eviter le jus de pamplemousse. RCP 24/10/2011 préparation extemporanée de la suspension buvable préparée à partir des cp 20mg	Revatio poudre pr susp buv 10mg/ml fl 112ml	1 oui/1 +labo	Pr la préparation des susp buv à partir des cp 20mg se reporter au RCP. Elle doit être faite par un pharmacien. La susp buv doit être administrée à l'aide d'une seringue graduée destinée à cet usage. Si possible faire un trait ou mettre en évidence sur la seringue graduée, la graduation correspondant à la dose appropriée pr chaque patient. La suspension doit être dans un flacon de verre brun ou en HDPE et conservée jusqu'à 28 jours au réfrigérateur (2 à 8 °C). La dilution doit se faire avec les diluants: Ora-Sweet et Ora-Plus (aucune donnée si autre diluant). Il existe des cas où les cp écrasés sont administrés par sonde NG mais avec les diluants recommandés ou non mais aucune étude du labo. (14/11/2012)
Revia 50mg	Naltrexone	Comprimé pelliculé sécable				2oui/2	Les cp ne sont NI GR, NI LP. D'un point de vue pharmaceutique, rien ne s'oppose à l'écrasement; mais aucune étude faite de bioéquivalence, stabilité (12/11/12)
Revlimid 5, 10, 15 et 25mg	Lenalidomide	Gélule		 Produit cytotoxique. D'après RCP 26/06/2012 "Les gélules ne doivent être ni ouvertes, ni cassées, ni mâchées"		1non/1	pas d'info labo mais impossible car PA cytotoxique
Reyataz 150mg, 200mg, 300mg	Atazanavir	Gélule	 NO			2non/2	Selon les mentions légales, les gélules doivent être avalées sans les ouvrir. Mais, d'un point de vue pharmaceutique, rien ne contre-indique leur ouverture: non GR, ni LP. Toutefois, nous ne disposons d'aucune donnée de stabilité de l'unité thérapeutique hors de son conditionnement primaire. Si l'on procédait à cette manipulation, il conviendrait de la faire de façon extemporanée. PA peu soluble dans l'eau. il est recommandé de ne pas utiliser cette forme d'administration de façon prolongée (20/11/12)
Rhinadvil	Ibuprofene, Pseudoephedrine	Comprimé enrobé	 Par SNG		autres PAs: Fervex granulés pour sol buv, Actifed états grippaux pdre pr sol buv, ...	1 non/1 +labo	Ecrasement modifie le temps d'absorption et de dilution. Possible si par SNG ms temps d'absorption diminué. Si mélangé, PA a un goût très piquant (de poivre) dc faire boire tout de suite après administration. Attention aux contre-indications (12/11/12)
Rifadine 300mg	Rifampicine	Gélule		A administrer 30 min avant le repas	Rifadine 100mg/5ml solution buvable, fl de 120 ml	2 oui/6 + labo	Il est possible d'ouvrir les gélules mais aucune étude sur la biodisponibilité // En l'absence de suspension disponible il est possible de solubiliser la poudre dans l'eau pour pouvoir mieux doser le produit
Rifater 120mg/50mg/300mg	Isoniazide, Pyrazinamide, Rifampicine	Comprimé enrobé		A administrer 30 min avant le repas		2 oui/2 +labo	En théorie possible de les écraser// pas étude de biodisponibilité comparative du cp enrobé et cp écrasé (goût amer)
Rifinah 150mg/300mg	Isoniazide, Rifampicine	Comprimé enrobé		A administrer 30 min avant le repas		1 oui/8 + labo	L'enrobage ne modifiant pas la biodisponibilité des PA, le cp réduit en poudre peut être utilisé. Toutefois il n'existe pas d'étude comparative entre la biodisponibilité du cp enrobé et celle du cp écrasé.







Rilutek 50mg	Riluzole	Comprimé pelliculé		Eviter les repas riches en graisses		1 oui/1 + labo	Aucune donnée sur les cps écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques mais aussi sur la tolérance // point de vue galénique le cp est enrobé et non sécable
Rimactan 300 mg	Rifampicine	Gélule		Prise au moins 30 minutes avant un repas	Rifadine 100mg/5ml solution buvable, fl de 120 ml	2non/2 + labo	aucune donnée (12/11/12)
Rimifon 50mg et 150mg	Isoniazide	Comprimé		A administrer le matin à jeun		8oui/8	
Risordan 20 mg	Isosorbide	Comprimé sécable		D'après RCP 20/07/2012 "Les cp doivent être avalés directement, sans être croqués ni sucés"		2 non/3 + labo	cp a libération immédiate mais de durée d'action prolongée // selon le RCP les cps doivent être avalés directement sans les croquer ni les sucer
Risperdal 1mg et 2mg	Rispéridone	Comprimé pelliculé sécable		-	Risperdal 1mg/ml, sol buv, fl. de 60ml; Risperdaloro	6 non/8+labo	Pas étude de biodisponibilité des cp écrasés. Pelliculage masque le goût amer des cps, il est déconseillé d'écraser les cp // alternative solution buvable
Risperdaloro 0,5mg et 1mg	Risperidone	Comprimé orodispersible		Laisser fondre le comprimé sur la langue	Risperdal 1mg/ml, sol buv, fl. de 60ml	4oui/4	
Ritaline 10mg	Methylphenidate	Comprimé sécable				1 oui/1 +labo	Aucune donnée // ce n'est pas une forme LP ni gastro-résistante // risque de perte de PA au moment du broyage// le cp broyé est à adm de façon extemporanée sur un aliment semi-solide (surtout ne pas dissoudre au préalable)/ Pour la manipulation du produit, tenir compte des données de sécurité pré-cliniques dans le Vidal. (06/11/12)
Ritaline LP 20mg et 30mg	Methylphenidate	Gélule		Ne pas écraser le contenu, mélanger avec un aliment froid semi-solide (compote de pommes). Le mélange doit être avalé immédiatement et entièrement		1non/1 +labo	Contenu peut être dispersé sur nourriture semi-solide (ex : compote). Aliments ne doivent pas être chauds car risque altération des propriétés de libération du PA // le mélange (contenu de la gel et aliments) doit être avalé immédiatement et entièrement. Ce mélange ne doit pas être conservé pour usage ultérieur (06/11/12)
Rivotril 2mg	Clonazepam	Comprimé sécable		-	Rivotril 2,5mg/ml, sol buv, fl. de 20ml	4 oui/8 + labo	Aucune étude car alternative par une solution buvable
Rocaltrol 0,25 µg	Calcitriol	Capsule molle		D'après le RCP 02/02/2012 "Avaler les capsules avec un peu d'eau, sans les sucer ni les croquer"	Sur avis et prescription médicale : autre PA: UN-ALFA sol buv en goutte fl 10ml, Dedrogyl sol buvable	2 non/3 + labo	Le PA est sensible à la lumière et à l'oxygène de l'air. Les capsules ne doivent pas être ouvertes en raison du risque de dégradation du PA.(23/11/12)
Rodogyl	Metronidazole, Spiramycine	Comprimé pelliculé				1 oui/1 + labo	Les cps ne sont pas gastro-résistants, il est donc possible de les écraser pour une administration par sonde entérale. Cependant il n'y aucune étude spécifique réalisée avec les cps écrasés ni par sonde. Pas de garantie que les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, ainsi que la tolérance, restent inchangés lors de l'administration de cps écrasés.
Rohypnol 1mg	Flunitrazepam	Comprimé pelliculé sécable		-		6 oui/7 + labo	Aucune étude






Rovalcyte 450mg	Valganciclovir	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer.  Produit carcinogène et tératogène Prise avec des aliments	ROVALCYTE 50mg/ml poudre pour suspension buvable	2non/2	
Rovamycine 1,5 et 3 mui	Spiramycine	Comprimé pelliculé		D'après le RCP 27/03/2012 "les cps sont à avaler tels quels avec un verre d'eau"	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autres macrolides : Erythrocline sol buv, Josacine sol buv, Mosil susp buv, Rulid cp séc pour susp buv, Zeclar sol buv, Zithromax sol buv	7 non/8 + labo	Pas d'étude réalisée // ne veulent pas envoyer une confirmation écrite mais pratique assez courante // cp à simple pelliculage
Rowasa 250 et 500mg	Mésalazine	Comprimé enrobé gastro-résistant		Prise au cours des repas	Rowasa suppo: Pentasa 1g ou 2g granules sachet	labo	CP GR // cette GR permet d'éviter toute destruction du PA dans l'estomac (site d'action: intestin grêle et colon)
Rulid 100 et 150 mg	Roxithromycine	Comprimé pelliculé pour le 100 et enrobé pour le 150		administrer avant les repas	Rulid 50mg cp sécable pour susp buvable (faire fondre dans un verre d'eau) Autres macrolides :	7 non/9 + labo	Aucune étude réalisée avec les cps 100mg et 150mg écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // Il n'y a pas lieu d'écraser les cps dans la mesure où il existe une alternative : Rulid 50mg cp sécable pour susp buv
Rythmodan 100mg	Disopyramide	Gélule				4 oui/4+labo	Absence d'étude donc non recommandé (29/10/2012)
Rythmodan LP 250mg	Disopyramide	Comprimé enrobé		Ne pas croquer	Rythmodan 100mg, gélule	4/4+labo	Non car forme LP
Rythmol 300mg	Propafenone	Comprimé pelliculé sécable				8oui/8 + labo	Non recommandé car aucune étude. Goût très amer et action anesthésique de surface. Possible par SNG
Sabril 500mg	Vigabatrine	Comprimé pelliculé sécable		A administrer toujours à la même heure	Sabril 500mg, poudre pour solution buvable en sachet (100 ml d'eau, jus de fruit, ou lait)	2 oui/3 + labo	Les cps de SABRIL doivent être avalés, entiers ou par demi-comprimés, avec au moins un demi-verre d'eau. En cas de besoin, il est recommandé de recourir à la forme "granulés pour suspension buvable en sachet".
Salazopyrine 500mg	Sulfasalazine	Comprimé enrobé gastro-résistant		Ne pas croquer, ni casser. Prise après le repas	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autres anti-inflammatoires (rectocolite): Pentasa 1g susp rectale fl 100ml	4non/4	
Salbumol 2 mg	Salbutamol	Comprimé			Salbumol suppo	3 non/4 + labo	Aucune étude donc non recommandé par le labo
Sandimmun 25mg, 50mg, 100mg	Ciclosporine	Capsule molle		Eviter le jus de pamplemousse. D'après le RCP 25/01/2012 "Les capsules peuvent être avalées intactes, ou mâchées (avec un grand verre d'eau)"	Sandimum 100mg/ml, sol buv, fl. de 50ml (diluée dans une boisson froide: chocolat, lait, cola, jus de fruits) jamais avec de l'eau et toujours dans un recipient en verre	2non/2	La forme galénique ne se prête pas à l'ouverture (12/11/12)



Sanmigran 0,5mg	Pizotifene	Comprimé enrobé		Eviter l'alcool	Sur avis et prescription médicale : Dihydroergotamine amdipharm ou Ikaran sol buv 2mg/ml fl 50 ml;	1 oui/1 + labo	Aucune donnée sur la modification éventuelle de l'absorption et de la biodisponibilité. Toutefois, si aucune autre alternative thérapeutique n'est possible, voici quelques informations utiles : ce n'est pas une forme LP ni GR / il y a risque de perte de PA au moment du broyage / le cp broyé serait à administrer de façon extemporanée sur un aliment semi-solide (surtout ne pas dissoudre au préalable) / pour la manipulation du produit, tenir compte des données de sécurité pré-cliniques mentionnées dans le Vidal / ce mode d'utilisation reste sous votre entière responsabilité. (06/11/12)
Savarine 200mg/100mg	Chloroquine, Proguanil	Comprimé pelliculé		Principe actif amer. Prise à heure fixe en fin de repas	Sur avis et prescription médicale : (Nivaquine 5mg/ml, sirop, fl. de 150ml + Proguanil 100mg, comprimé écrasable); Autre association: Malarone cp écrasables	2non/2	Le dossier d'AMM ne contient pas d'étude spécifique de biodisponibilité ni de stabilité en cas d'écrasement du cp. Dans les "recommandations sanitaires pour les voyageurs 2012" et les "Recommandations pour la pratique clinique 2007" il est spécifié pr la chimioprophylaxie du Paludisme qu' "avant l'âge de 6 ans, les cp doivent être écrasés". Le pelliculage masque le goût amer des PA
Sectral 200mg et 400mg	Acebutolol	Comprimé pelliculé		Administration extemporanée. Ne pas croquer (29/10/2012)	Sectral 40mg/ml, sol buv, fl. de 125ml	4 oui/9+labo	Aucune donnée sur les cps écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques mais aussi sur la tolérance // mais cps à libération immédiate donc possibilité de les écraser finement en utilisation extemporanée mais pas d'info sur la biodisponibilité de cette préparation // goût désagréable car pelliculage rompu
Sectral LP 500mg	Acebutolol	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer, ni broyer	Sectral 40mg/ml, sol buv, fl. de 125ml	4non/4	
Seglor 5 mg	Dihydroergotamine	Gélule		Prise au milieu du repas	Dihydroergotamine, Ikaran sol buvable	2non/2	
Seloken 100mg	Metoprolol	Comprimé sécable		A administrer au cours ou en fin de repas		5/5+labo	hors AMM pour ce type d'administration // produit ayant formulation galénique à libération immédiate et que techniquement rien ne s'oppose à l'écrasement ou pulvérisation
Seloken LP 200mg	Metoprolol	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer. A administrer au cours ou en fin de repas	Seloken 100mg, comprimé	7non/7	
Selozok LP 23,75, 95 et 190mg	Metoprolol	Comprimé pelliculé à libération prolongée (sécable pour le 23,75mg)		RCP 20/07/2012 " doivent être avalés avec un peu de liquide et ne doivent être ni croqués ni écrasés"		labo	Le cp ne peut être ni concassé, ni broyé. La formulation galénique est donnée grâce à une matrice poreuse inerte sur laquelle vient adhérer le principe actif, qui ne doit pas être détruite.
Semap 20mg	Penfluridol	Comprimé		-		2non/2	










Serc 8mg	Betahistine	Comprimé		D'après le RCP 20/08/12: "les cps doivent être avalés sans être croqués avec un verre d'eau au cours des repas" (la prise au cours des repas évite les gastralgies).		3 oui/4 + labo	Possible de les écraser mais aucune étude (12/11/12)
Serecor LP 300 mg	Hydroquinidine	Gélule		attention à ne pas broyer les microgranules gastrorésistants. (29/10/2012)		4oui/4	
Seresta 10mg et 50mg	Oxazepam	Comprimé (sécable pour le 50 mg)				11oui/11 + labo	Ecrasement possible (12/11/12)
Sermion 5 et 10 mg	Nicergoline	Gélule		Prise avant les repas. RCP 06/03/2012 " avaler avec un demi verre d'eau"		2oui/2	
Seroplex 5mg, 10mg, 15mg et 20mg	escitalopram	Comprimé pelliculé sécable (sauf le 5mg)		Broyer le comprimé, pas de jus de pamplemousse	Seroplex 20mg/ml sol buv fl 15 ml (eau, jus d'orange ou de pomme)	4 oui/5+labo	Aucune donnée // les caractéristiques galéniques ne laissent pas présager d'une différence importante sur la pharmacocinétique du produit ; le rôle du pelliculage servant à masquer le goût amer du PA // à diluer dans eau de façon extemporanée en évitant de diluer dans jus de pamplemousse qui peut augmenter la biodisponibilité de certains composés
Seropram 20mg	Citalopram	Comprimé pelliculé sécable		PA amer	Seropram 40mg/ml, sol buv, fl. de 12ml (dans eau, jus d'orange ou de pomme)	5 oui/7 + labo	Non recommandé car aucune donnée // mais le pelliculage n'est pas GR donc il ne devrait pas y avoir de conséquence sur l'absorption // alternative par une forme buvable a 40mg/ml
Sertraline 25mg et 50mg	Sertraline	Gélule		Prise au cours du repas		1 oui/1 +labo	Aucune donnée, donc non recommandé (étude en cours), Pb de tolérance gastro-intestinale. (12/11/12)
Sevredol 10mg et 20mg	Morphine sulfate	Comprimé pelliculé sécable		Stupéfiant	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Oramorph sol buv; Actiskénan 10mg et 20mg.gélules	2non/2	
Sibelium 10 mg	Flunarizine	Comprimé sécable		Prise le soir au coucher		1 non/1 + labo	aucune donnée de biodisponibilité des cp après écrasement. Il est donc déconseillé d'écraser les comprimés. Les comprimés sont sécables.
Sifrol 0,18mg et 0,7mg	Pramipexole	Comprimé sécable à libération immédiate		-		2 non/2+labo	Pas de donnée sur la cinétique et efficacité clinique
Sifrol LP 0,26 - 0,52 - 1,05 et 2,1 mg	Pramipexole	Comprimé à libération prolongée		Prise à heure fixe		labo	Forme galénique à LP permet absorption régulière et soutenue dans le temps du PA d'un médicament // les cps ne doivent pas être mâchés, coupés ou écrasés.
Simvastatine 20mg et 40mg	Simvastatine	Comprimé pelliculé		Eviter le pamplemousse (29/10/2012)	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autres statines : Tahor, Pravastatine	2non/2+labo	Aucune donnée ne permettant d'écraser les cps













Sinemet 100mg/10mg et 250mg/25mg	Carbidopa, Levodopa	Comprimé sécable		RCP 25/01/2012 "avaler les cp sans les mâcher ni les écraser". Prise en fin de repas ou avec un peu de nourriture		12 oui/13 + labo	Pas d'étude
Sinemet LP 100mg/25mg et 200mg/50mg	Carbidopa, Levodopa	Comprimé à libération prolongée		Ne pas croquer, ni mâcher.	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Modopar cp dispersible	8non/8	
Singulair 4mg et 5mg	Montelukast	Comprimé à croquer		Le soir en dehors du repas		3oui/3	
Singulair 10mg	Montelukast	Comprimé pelliculé			Singulair 4mg sachets-dose : Les granulés peuvent être administrés directement dans la bouche ou mélangés avec une cuillère de nourriture semi-liquide froide ou à température ambiante (compote de pommes, glace, carottes et riz par exemple). Singulair 5mg cp à croquer	3 oui/4	pas d'info labo mais alternative par Singulair 4mg sachets dose ou Singulair 5mg cps à croquer
Sintrom 4mg	Acenocoumarol	Comprimé sécable		A administrer à heure fixe		2 non/8+labo	Le cp est quadrisécable et peut être coupé pour faciliter la prise. Compte-tenu de sa marge thérapeutique étroite, le cp ne doit pas être écrasé; il y a un risque important de perte du PA et donc d'inefficacité. Ce mode d'utilisation reste sous la responsabilité du professionnel de santé. (12/11/12)
Skenan LP 10mg, 30mg, 60mg, 100mg et 200mg	Morphine sulfate	Gélule		contenu peut être administré directement dans un aliment semi- solide (purée, confiture, yaourt), ou dans des sondes gastriques ou de gastrostomie de diamètre supérieur à 16 F.G, à extrémité distale ouverte ou à pores latéraux. Un rinçage de la sonde avec 30 à 50 ml d'eau est suffisant.		10oui/10	Stupéfiant. D'après le RCP "dans le cas où les gélules ne peuvent être avalées, leur contenu peut être administré directement dans une alimentation semi-solide (purée, confiture, yaourt), ou encore dans des sondes gastriques ou de gastrostomie de diamètre supérieur à 16 F.G. à extrémité distale ouverte ou à pores latéraux. Un rinçage de la sonde avec 30 à 50 ml d'eau est suffisant". (Info 2011)
Sodium chlorure 250 mg, 1g	Sodium chlorure	Gélule			sachet poudre 1 g	3oui/3	
Solian 100mg, 200mg et 400mg	Amisulpride	Comprimé sécable (pelliculé pour le 400mg)		Ne pas croquer. Ne pas mâcher. Administrer avec de l'eau.	Solian 100mg/ml, sol buv, fl. de 60ml	6 non/9+labo	Pas de raison d'écraser les cps car existe la solution buvable 100 mg/ml









Sophidone LP 4mg, 8mg, 16mg et 24mg	Hydromorphe	Gélule		Stupéfiant. Ne pas écraser, ni croquer le contenu. Peut être mélangé avec un aliment semi-solide (purée, confiture, yaourt, compote)		5 oui/6+labo	Possibilité d'ouvrir les gélules et d'administrer le contenu dans alimentation semi solide; mais les granules ne doivent pas être écrasés pilés ou mâchés car risque de surdosage
Soriatane 10mg, 25mg	Acitretine	Gélule		Prise au cours du repas		2oui/2 + labo	PA très photosensible, si ouverture de la gélule alors l'administration doit être immédiate (ds la seconde) ou faite sous lumière actinique et mélangée avec de l'eau, yaourt, jus d'orange (12/11/12)
Sotalex 80mg et 160mg	Sotalol	Comprimé sécable				9 oui/11+labo	Les cp ne sont ni GR, ni LP. D'un point de vue pharmaceutique, rien ne s'oppose à l'écrasement; mais aucune étude faite de bioéquivalence, stabilité (12/11/12)
Spasfon 80mg	Phloroglucinol, Triméthylphloroglucinol	Comprimé enrobé		-	Spasfon lycoc 80mg	3 oui/7 + labo	Non recommandé par le labo, les cp doivent être avalés en entier (05/11/12)
Spasfon lycoc 80mg	Phloroglucinol	Lyophilisat oral		A dissoudre dans l'eau ou à faire fondre sous la langue		7oui/7	
Speciafoldine 0,4mg et 5mg	Acide folique	Comprimé		-		9oui/9	
Sporanox 100mg	Itraconazole	Gélule		D'après RCP 29/02/12: "les gélules doivent être absorbées sans être ouvertes, immédiatement après un repas, de préférence en une seule prise".	Sporanox 10mg/ml, sol buv, fl. de 150ml	3 non/4	pas d'info labo mais alternative possible par une forme buvable
Stablon 12,5 mg	Tianeptine	Comprimé enrobé		A administrer au début du repas		11oui/11 + labo	Peut être administré en suspension après broyage, la cinétique sera peu modifiée
Stagid 700mg	Metformine	Comprimé sécable		A administrer au cours ou en fin de repas. Theriaque 22/12/11: Ne pas croquer, ni écraser		7 oui/7 + labo	Le cp peut être écrasé ou broyé ms il a un goût amer (12/11/12)
Stalevo tous dosage	Carbidopa; Entacapone, Levodopa	Comprimé pelliculé		RCP 25/01/2012 Un cp correspond à une dose et ne doit en aucun cas être fractionné		3 oui/5 + labo	Aucune donnée mais les cps ne sont ni gastro-résistant ni LP donc c'est normalement possible // risque de perdre de la poudre // administration extemporanée sur un aliment semi-solide (ne pas dissoudre au préalable)
Stilnox 10mg	Zolpidem	Comprimé pelliculé sécable		administration immédiate car photo-oxydation		8 oui/9 + labo	Pelliculage opaque qui protège de la lumière/ le zolpidem se dégrade à la lumière les produits de dégradation entraînent un jaunissement de la poudre donc instabilité à la lumière// interactions chimiques peuvent se produire entre excipients des produits et entraîner des précipités
Stromectol 3mg	Ivermectine	Comprimé		A administrer à jeun. Chez l'enfant de moins de 6 ans, les cps seront écrasés avant d'être avalés.(Info 2011)		4oui/4	

Subutex 0,4mg, 2mg, 8mg	Buprenorphine	Comprimé sublingual		Laisser fondre le comprimé sous la langue		4non/4	
Sulfarlem 12,5mg et s25mg	Anetholtrithione	Comprimé enrobé		administration avant le repas		1 non/8 + labo	Aucune étude n'a été faite et non recommandé de l'écraser (cp pelliculé) (12/11/12)
Surbronc expectorant 30mg	Ambroxol	Comprimé sécable			Surbronc Ambroxol 0,6% sans sucre, sol buv, fl.100ml	1 non/2 + labo	pas d'étude faite
Surgam 100mg et 200mg	Acide tiaprofenique	Comprimé sécable		A avaler tels quels ou dissous dans un grand verre d'eau.		4oui/4	
Surmontil 25 et 100 mg	Trimipramine	Comprimé (pelliculé sécable pour le 100mg)			Surmontil buvable	3 non/5 + labo	Aucune étude réalisée avec les cps 25mg et 100mg écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // Il n'y a pas lieu d'écraser les cps dans la mesure où il existe une alternative par une solution buvable à 4%
Sustiva 200mg	Efavirenz	Gélule		A administrer à jeun. RCP 17/07/2012 L'administration du contenu des gélules avec une faible quantité de nourriture (1-2 cuillères à café) peut être envisagée	Sustiva 30mg/ml, sol buv, fl. de 180ml	5non/5	L'administration du contenu des gélules avec une faible quantité de nourriture (1-2 cuillères à café) peut être envisagée chez des patients ne supportant pas la solution buvable.(23/11/12) Les patients et personnes administrant le médicament doivent ouvrir soigneusement les gélules afin d'éviter que le contenu ne se renverse ou ne se disperse dans l'air. Il est recommandé d'administrer le mélange (meilleur goût avec de la gelée de raisin) immédiatement. Après administration, une petite quantité supplémentaire de nourriture (2 cuillères à café) doit être ajoutée dans le recipient ayant servi à faire le mélange afin de récupérer tout résidu de médicament puis administré au patient. Aucune nourriture supplémentaire ne doit être consommée pendant au moins 2 heures après
Sustiva 600mg	Efavirenz	Comprimé pelliculé		A administrer à jeun.	Sustiva 30mg/ml, sol buv, fl. de 180ml	2non/2	Ecrasement hors AMM. D'un point de vue pharmaceutique, il n'y a pas de contre-indication à les écraser dans la mesure où ils ne sont ni GR, ni LP. Toutefois nous ne disposons d'aucune donnée permettant de garantir la bioéquivalence entre l'administration du cp entier et celle du cp broyé, ni de donnée de stabilité. (23/11/12)
Synedil 50mg	Sulpiride	Gélule			Synedil solution buvable à 0,5g/100ml fl 200ml	1 non/1	aucune étude du labo mais alternative possible par une solution buvable
Synedil fort 200mg	Sulpiride	Comprimé			Synedil solution buvable à 0,5g/100ml fl 200ml		pas d'info labo mais alternative possible par une solution buvable
Tadenan 50mg	Extrait de prunier d'Afrique	Capsule molle		A administrer 30min avant le repas		4 non/6 + labo	Non recommandé par le labo // Le contenu de la capsule est une suspension huileuse // pb de l'intégrité de la dose et de l'incorporation à des produits hydrophiles // Mais pas d'étude réalisée









Tahor 10mg, 20mg, 40mg, 80mg	Atorvastatine	Comprimé pelliculé	 Par SNG	-	Tahor cp à croquer	9oui/9	Le labo ne suggère, et ne recommande une utilisation hors AMM du médicament. Aucune étude sur cette forme d'utilisation. PA peu hydrosoluble et est photosensible. Ce n'est pas une forme LP, ni à libération modifiée ou retardée. Toutefois, le manuel sur l'administration entérale par sondes gastriques dit: les cp 10mg, 20mg, et 40mg se dissolvent en 2 à 5 minutes, lorsqu'ils sont placés dans 10ml d'eau, pr produire une dispersion très fine qui ne se dépose pas rapidement. Cette suspension s'écoule dans une sonde NG 8Fr sans obstruction. Disperser le cp ds l'eau et administrer immédiatement. Aucune pause de l'alimentation n'est requise. Aucune interaction significative avec la nourriture. Noter que les effets secondaires les plus fréquents avec la suspension étaient des céphalées, diarrhée, flatulences et nausées.(14/11/2012)
Tamiflu 30, 45 et 75mg	Oseltamivir	Gélule			Tamiflu poudre pour susp buv 6 ou 12 mg/ml. Après reconstitution avec 52 ml d'eau, le volume de suspension buvable utilisable correspond à un total de 10 doses d'oseltamivir 75 mg.	1 oui/3 + labo	Il est précisé dans le RCP : "Lorsque les dosages appropriés de gélules sont disponibles, la dose est obtenue en ouvrant la gélule et en mélangeant son contenu avec au maximum une cuillère à café d'un aliment sucré approprié. Le goût amer peut être masqué par des produits comme : de l'eau sucrée, du chocolat liquide, du sirop de cerises, du coulis pour dessert (comme une sauce caramel ou chocolat). La préparation doit être mélangée et administrée au patient dans sa totalité. Le mélange doit être immédiatement avalé après sa préparation,"
Tamoxifene 10mg et 20mg	Tamoxifene	Comprimé pelliculé (sécable pour le 20mg)		Ne pas faire manipuler par femme enceinte se protéger avec gants et masque adm. aussitôt après écrasement et mise en suspension		3/5+labo	oui
Tanakan 40mg	Extrait Ginkgo biloba	Comprimé enrobé		prise pendant le repas	Tanakan 40mg/ml solution buvable	1 non/1	pas d'info labo mais alternative possible par Tanakan solution buvable
Tanganil 500mg	Acetyl leucine	Comprimé		-		8oui/8 +labo	En l'absence d'étude pharmacocinétique et de tolérance, le labo ne recommande pas d'écraser les cp (08/11/12)
Tarceva 100mg et 150mg	Erlotinib	Comprimé pelliculé		-		2 oui/3+labo	Aucune donnée de pharmacocinétique // suite à une étude possibilité de dissoudre les cps dans eau sterile et de secouer pour obtention solution homogène lors d'une administration par SNG mais cela reste sous entière responsabilité du prescripteur











Tardyferon B9	Acide folique, Sulfate ferreux	Comprimé pelliculé		Prise avant le repas	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Fumafer poudre orale	5 non/7	Les cps ne doivent pas être broyés, au risque de modifier la biodisponibilité de la spécialité. En effet, les cps sont formulés spécifiquement pour une bonne absorption au niveau duodénal et de la partie proximale du jéjunum. De plus, le goût après broyage serait vraiment désagréable et ne permettrait pas une bonne observance du traitement. (Info 2011)
Tardyferon 80mg	Sulfate ferreux	comprimé enrobé					Les cps ne doivent pas être broyés, au risque de modifier la biodisponibilité de la spécialité. En effet, les cps sont formulés spécifiquement pour une bonne absorption au niveau duodénal et de la partie proximale du jéjunum. De plus, le goût après broyage serait vraiment désagréable et ne permettrait pas une bonne observance du traitement. (Info 2011)
Tareg 40mg, 80mg et 160mg	Valsartan	Comprimé pelliculé sécable		-	Tareg sol buv 3mg/ml fl 160ml	4 non/5+labo	Cp peut être coupé en 2 // aucune donnée sur modification éventuelle de l'absorption et biodisponibilité // le PA est insoluble dans eau et a un goût amer // Ce n'est pas une forme LP ni GR // Risque de perte de PA lors du broyage // Le cp broyé doit être administré de façon extemporanée sur un aliment semi-solide (surtt ne pas dissoudre au préalable) // Verifier ds le Vidal les données de sécurité pré-cliniques (12/11/12)
Tarka LP 180mg/2mg	Trandolapril, Verapamil	Comprimé pelliculé à libération prolongée		Ne pas croquer	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : autres inhibiteurs calciques : Isoptine, Amlodipine, Loxen, Nifédipine sol buv, Unicordium	2non/2	pas d'info labo mais impossible car forme à LP
Tavanic 500mg	Levofloxacin	Comprimé pelliculé sécable		Administration extemporanée		5oui/5+labo	Enrobage n'est pas gastroresistant donc possibilité de les écraser mais utilisation à faire de façon extemporanée car le PA est sensible à la lumière // aucune étude de pharmacocinétique
Tegretol 200 mg	Carbamazepine	Comprimé sécable		RCP 20/07/2012 Ne pas croquer ni écraser les cp	Tegretol 20mg/ml, susp buv, Fl. de 150ml	1 oui/8+labo	Cp peut être coupé en 2 // existe forme buvable
Tegretol LP 200 mg, 400mg	Carbamazepine	Comprimé pelliculé sécable à libération prolongée		Ne pas croquer. Ne pas mâcher. Administrer pendant ou après un repas. (RCP 20/07/2012)	Tegretol 20mg/ml, susp buv, Fl. de 150ml	9non/9+labo	Ne pas croquer ni écraser car il s'agit d'une forme LP et la cinétique serait modifiée.
Telzir 700mg	Fosamprenavir	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer.	Telzir 50mg/ml, sol buv, fl. de 225ml	2non/2	
Temerit 5mg	Nevibolol	Comprimé quadrisécable		-		4oui/4	
Temesta 1mg et 2,5mg	Lorazepam	Comprimé sécable		-	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autre PA: Lysanxia sol buv 15mg/ml fl 20ml; Valium Roche sol buv	10oui/10 + labo	Ecrasement possible (12/11/12)










Temgesic 0,2mg	Buprenorphine	Comprimé sublingual		Ne pas croquer. Laisser fondre sous la langue		5non/5	
Temodal 5mg, 20mg, 100mg, 140mg et 250mg	Temozolomide	Gélule		Ne pas croquer. Produit cytotoxique		2non/2	
Tenordate	Atenolol, Nifedipine	Gélule		prise à distance des repas		3non/3 + labo	Renferme de la poudre d'aténolol et un cp de nifédipine LP. Ces 2 formes ne doivent pas être détériorées et doivent être absorbées dans leur intégralité. Dc gélules ne peuvent être ouvertes pour en faciliter l'absorption.
Tenoretic 50mg/12,5mg	Atenolol, Chlortalidone	Comprimé pelliculé sécable				1 non/1 + labo	aucune étude de pharmacocinétique mais n'est ni LP, ni GR. Si écrasement: administration immédiate après mise en suspension, ne pas garder les suspensions.
Tenormine 50mg et 100mg	Atenolol	Comprimé pelliculé sécable		Administrer le matin de préférence.		5oui/5	aucune étude pharmacocinétique, mais ni LP, ni GR. Si écrasement administrer aussitôt après écrasement et mise en suspension, ne pas garder la suspension.
Tenstaten 50mg	Cicletanine	Gélule		-		3 oui/3	
Teralithe 250mg	Lithium	Comprimé sécable		A administrer au cours ou en fin de repas		5 oui/5 + labo	Aucune étude réalisée avec les cp écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // Le cp sécable 250mg est un cp nu à libération immédiate.
Teralithe LP 400 mg	Lithium	Comprimé sécable à libération prolongée		Ne pas croquer, ni sucer. A administrer au cours ou en fin de repas	Teralithe 250mg	4 non/5 + labo	Aucune étude réalisée avec les cps écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // Le cp sécable à 400mg est à LP
Tercian 25 et 100mg	Cyamemazine	Comprimé pelliculé sécable			Tercian 40mg/ml, sol buv, fl. de 30ml	5 non/8 + labo	Aucune étude réalisée avec les cps écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // Il n'y a pas lieu d'écraser les cps car il existe une alternative par une solution buvable a 40mg/ml
Thalidomide 50mg	Thalidomide	Gélule		 Produit cytotoxique. Therisque 25/10/12: Ne pas ouvrir, ni croquer, ni écraser		1non/1	pas d'info labo mais impossible car PA cytotoxique
Théostat	Theophylline	Comprimé sécable à libération prolongée		Ne pas écraser. Ne pas croquer.		3non/3	
Theralene	Alimemazine	Comprimé pelliculé sécable			Theralène 0,05% sirop ou Theralène 4% solution buvable en gouttes	1 non/1	Ecrasement possible car film non gastro-résistant. Aternative possible par Théralène sirop ou solution buvable en gouttes
Tiapridal 100mg	Tiapride	Comprimé sécable			Tiapridal 5mg/goutte, solu buv en goutte, fl. de 30ml	10 oui/10+labo	Pas de raison d'écraser les cp car existe la solution buvable 5 mg/goutte // aucune étude sur les cps écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques mais aussi sur la tolérance // le PA est soluble dans l'eau et cp nus









Tibéral 500mg	Ornidazole	Comprimé		-	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Flagyl oral 4% susp buvable	1 non/2 + labo	non
Ticlid 250mg	Ticlopidine	Comprimé pelliculé		administration immédiate car photosensible		4oui/4	
Tilcotil 20mg	Tenoxicam	Comprimé pelliculé sécable		D'après RCP 19/03/2012 "les cps sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau".	Tilcotil suppos	1 oui/1	Compte tenu de la sensibilité du tenoxicam à l'oxydation, le labo ne peut que déconseiller le broyage des comprimés.(Info 2011)
Tildiem 60mg	Diltiazem	Comprimé		Ne pas croquer	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : autres inhibiteurs calciques : Isoptine, Amlodipine, Loxen, Nifédipine sol buv, Unicordium	7non/7	
Tiorfan 100mg	Racécadotril	Gélule		goût désagréable, prise avant le repas	Tiorfan poudre sachets-dose à 30 ou 10mg	5oui/5	
Tofranil 10 et 25mg	Imipramine	Comprimé enrobé		-		1 oui/1 + labo	Aucune étude clinique n'a été menée sur l'utilisation de ces médicaments une fois les cp écrasés et aucune donnée à ce sujet dans l'AMM, Donc pas de garantie sur la qualité et l'efficacité de cette spécialité lors d'une telle utilisation (08/11/12)
Topalgic 50mg	Tramadol	Gélule		dilution dans un yaourt	Topalgic 100mg/ml, sol buv, fl. de 10ml ou utilisation de Tramadol 50mg cpr effervescent	4 oui/6 + labo	Aucune étude réalisée avec les cps écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et sur la tolérance // D'un point de vue galénique il est possible d'ouvrir les gélules et de dissoudre le contenu dans une solution aqueuse car le tramadol est hydrosoluble // chez les patients sondés l'utilisation des formes liquides doit toujours être préférée // Attention si sonde duodéno-jéjunale car le PA est absorbé au niveau de la partie haute du jejunum (risque de diminution de l'absorption)
Topalgic LP 100mg, 150mg et 200mg	Tramadol	Comprimé à libération prolongée		RCP 13/07/2012 Les comprimés ne devront pas être fractionnés ou mâchés et devront être pris entiers avec une quantité suffisante de boisson, indépendamment des repas.	Topalgic 100mg/ml, sol buv, fl. de 10ml	6non/6	pas d'info labo mais impossible car forme LP
Tracleer 65,5mg et 125mg	Bosentan	Comprimé pelliculé		-	Tracleer 32mg forme dispersible, cp quadrisécable	1 oui/1 +labo	Si les cp ne peuvent être avalés, ils peuvent être administrés sous forme d'une suspension liquide préparée extemporanément. Les comprimés se dispersent rapidement (en moins de 5 min) dans des liquides tel que l'eau, mais le produit reste en suspension au lieu de former une véritable solution. Il n'est pas nécessaire d'écraser les comprimés au préalable. La suspension doit être préparée immédiatement avant l'administration, car le produit n'est pas stable en suspension. NB : Il existe une forme dispersible : TRACLEER 32mg

Trandate 200mg	Labetalol	Comprimé pelliculé sécable		prise en fin de repas.		7/7 + labo	Une étude a montré la stabilité des cp écrasés dissous ds les liquides suivant: eau, jus de fruit (pomme orange, raisin), lorsque la solution est conservée ds des flacons teintés à température ambiante et à 4°C. Mais le PA étant photosensible, cette étude ne permet pas à elle seule de garantir l'efficacité du produit après modification de sa forme et notamment après la rupture de son pelliculage. Exceptionnellement écrasement possible ms administration immédiate. (12/11/12)
Tranxene 5mg, 10mg et 20mg	Clorazepate dipotassique	Gélule		Photosensible	Lysanxia sol buvable (sauf indic Tétanos)	3 non/9+labo	Aucune donnée sur les gélules ouvertes donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques mais aussi sur la tolérance // le PA est sensible à la lumière et à l'humidité de ce fait les gélules sont opaques et fermées de façon spécifique
Tredemine 500 mg	Niclosamide	Comprimé à croquer				2 oui/3 + labo	oui il est possible de les écraser // D'après le RCP: " les cps doivent être mastiqués longuement et complètement puis avalés avec très peu d'eau afin que le médicament arrive au niveau de l'estomac sous forme pulvérulente. Pour les enfants de moins de 6 ans écraser préalablement les cps
Trentadil 300mg	Bamifylline	Comprimé enrobé		Goût amer. D'après le RCP 13/02/12 "le cp sera avalé sans être croqué"		1 oui/2 + labo	Possible car cp à libération immédiate // cp enrobé car PA très amer l'observance du traitement peut donc être altérée
Triatec 1.25, 2.5, 5 et 10mg	Ramipril	Comprimé sécable pour les dosages 2,5 - 5 et 10 mg		D'après le RCP 11/09/12 "Triatec doit être avalé avec du liquide. Il ne doit être ni mâché, ni écrasé".	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autres IEC : Enalapril, Coversyl, Cibacène, Lisinopril	6 oui/6+labo	Au niveau galénique le cp n'est pas gastro-résistant ni retard. Cependant aucune donnée sur les cps écrasés ou broyés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques mais aussi sur la tolérance // le labo ne le recommande pas // pour les SNG le labo ne le recommande pas car aucune étude faite // procédure hors AMM. (Info Oct 2011)
Triflucan 50mg, 100 mg et 200mg	Fluconazole	Gélule			Triflucan forme buvable 50mg/5ml ou 200mg/5ml, flacon de 35ml	6oui/6	Le labo ne suggère ni ne recommande une utilisation hors AMM. Aucune étude de pharmacocinétique, d'efficacité ou de sécurité d'emploi. Toutefois, la référence standard, Martindale, rapporte que le PA est légèrement soluble dans l'eau. Par ailleurs, le PA est cité comme poudre hygroscopique, ce qui peut influencer sur la stabilité du PA en cas d'ouverture des gélules et nécessiter une administration immédiate du contenu des gélules ouvertes. (14/11/2012)
Trileptal 300mg	Oxcarbazepine	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer	Trileptal 60mg/ml, susp buv, fl. de 250ml	7 non/8 + labo	Alternative par une suspension buvable donc pas d'étude réalisée même si l'écrasement est possible sur le plan galénique // risque de perte de PA
Trinitrine 0,15mg	Trinitrine	pilule enrobée		Voie sublinguale. Croquer lentement la pilule enrobée et la garder quelque temps dans la bouche.		1 non/1	


Trivastal 20mg	Piribedil	Comprimé enrobé		D'après RCP 14/09/2012 "les cp sont à avaler avec un demi-verre d'eau, sans les croquer, en fin de repas".		4 oui/6 + labo	Ecrasement possible car forme non LP
Trivastal LP 50mg	Piribedil	Comprimé enrobé		Ne pas croquer	Trivastal 20mg, alternative	8non/8 + labo	Forme LP donc risque d'accélérer la cinétique et d'exercer un effet pharmacodynamique excessif
Trizivir 300mg, 150mg	Abacavir, Lamivudine, Zidovudine	Comprimé pelliculé			<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Ziagen 20mg/ml, sol buv, fl. de 240ml + Epivir 10mg/ml, sol buv, fl. de 240ml + Retrovir 100mg/ml, sol buv, fl. de 200ml	2non/2	
Trolovol 300mg	Penicillamine	Comprimé pelliculé		A distance des repas		2oui/2	
Truvada 200mg/245mg	Emtricitabine, Tenofovir	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer. Le cp Truvada peut être délité dans 100ml d'eau, de jus d'orange ou de raisin et administré immédiatement après.(RCP 02/05/2012)		2non/2	
Ubiteo 50mg	Decorenone	Gélule			Ubiteo 50mg/10 ml solution buvable, flacon	1 oui/1	pas d'info labo mais alternative possible par une forme buvable
UFT 100mg/224mg	Tegafur, Uracile	Gélule		 Ne pas ouvrir, PA cytotoxique		1non/1	pas d'info labo mais impossible car produit cytotoxique
Ultralevure 50 et 200mg	Saccharomyces boulardii	Gélule		contre-indiqué si présence d'un cathéter central (dispersion spores), goût amer et mauvaise odeur	Ultra-levure Poudre pour suspension buvable : Sachets, boîte de 20.	1 oui/1	aucune donnée. La gélule masque l'odeur et le goût. Possible de mettre en suspension ms veiller à ce que le patient prenne la totalité de la dose. La poudre étant légère, il y a un risque de contamination des abords veineux provoquant une fongémie. Attention si par SNG (12/11/12)
Un-alfa 0,25mg, 0,5mg et 1µg	Alfacalcidol	Capsule molle		Ne pas croquer, ne pas écraser	Un-alfa sol buv en goutte fl 10ml	5non/5	
Urbanyl 5 mg	Clobazam	Gélule				1 non/2 + labo	Pas d'étude. La gélule peut être ouverte d'un point de vue galénique. Le clobazam est peu soluble dans l'eau.
Urbanyl 10mg, 20mg	Clobazam	Comprimé (sécable pour le 10mg)		-		5 non/9 + labo	Aucune donnée sur les cps écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques mais aussi sur la tolérance // au niveau galénique le cp est nu et le PA est peu soluble dans l'eau
Uromitexan 400mg, 600mg	Mesna	Comprimé pelliculé sécable		-	Les ampoules pour la voie injectable peuvent être avalées.	2 oui/3 + labo	Aucune étude, dc non recommandé. L'écrasement des cp en vue de leur utilisation par SNG est couramment fait.
Ursolvan 200mg	Acide ursodesoxycholique	Gélule		Prise au moment des repas		1 oui/2 + labo	Aucune étude réalisée avec les cps écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // D'un point de vue galénique il est possible de les ouvrir // Le PA est peu soluble dans l'eau

Utrogestan 100 mg	Progesterone	Capsule molle		prise à distance des repas		3non/3 + labo	non, Renferme une suspension en phase huileuse
Vadilex 20mg	Ifenprodil	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer	Tanakan sol buv, Tramisal sol buv, Vitalogink sol buv	2non/2	
Valdoxan 25 mg	Agomelatine	Comprimé pelliculé				labo	Peut être administré en suspension après broyage, la cinétique sera peu modifiée
Valium 2mg, 5mg et 10mg	Diazepam	Comprimé sécable		-	Valium 1%, sol buv en gouttes, fl. de 20ml	3 oui/8 + labo	Aucune étude car alternative par une solution buvable
Vastarel 20mg	Trimetazidine	Comprimé pelliculé		prise pendant les repas. Theriaque 13/11/12: Ne pas croquer, ni écraser	Vastarel solution buvable à 20mg/ml flacon de 60ml, prise pendant les repas	2 oui/3 + labo	Ecrasement possible car forme non LP // Alternative possible par une solution buvable à 20mg
Vastarel LP 35mg	Trimetazidine	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer	Vastarel 20mg/ml, sol buv, fl. de 60ml	10non/10 + labo	impossible car forme LP
Vasten 10, 20 et 40mg	Pravastatine	Comprimé sécable (sauf le 40mg)		Administration immédiate		3 oui/3	
Vectarion 50mg	Almitrine	Comprimé pelliculé sécable		Prise pendant le repas		6 oui/6 + labo	Peut être administré en suspension après broyage, la cinétique sera peu modifiée
Vfend 50mg et 200mg	Voriconazole	Comprimé pelliculé		Administration extemporanée. Theriaque 20/11/12: ne pas croquer, ni écraser	Vfend 40mg/ml, sol buv, fl. de 70ml	2 oui/4+labo	Le labo ne suggère ni ne recommande toute utilisation hors AMM du médicament. Aucune étude sur une utilisation par voie naso-gastrique. Il existe des cas où le médicament est administré par sonde gastrique. Des essais cliniques ont été menés concernant le taux plasmatique et la pharmacocinétique comparés des cp avalés en entiers et des cp écrasés. Le manuel d'administration entérale du médicament par sonde gastrique indique que la poudre a été placée dans l'eau. Aucune perte d'efficacité n'est attendue mais il existe un risque d'obstruction de la sonde. Par sonde nasojéjunale, il faut surveiller les concentrations sériques minimales.(14/11/2012)
Vibramycine	Doxycycline	Comprimé sécable		Prise pendant les repas, Ne pas s'allonger dans les 30 min suivant la prise. Ne pas administrer en même temps qu'un aliment lacté. Dissoudre le cp dans l'eau		2oui/2 + labo	D'après le RCP: "Délayés dans un demi-verre d'eau. Dans ce cas, et afin d'avalier tout ce médicament, il est recommandé de bien agiter après dispersion des comprimés dans l'eau. La couleur jaune est normale, c'est celle du principe actif"
Videx 25, 50, 100 et 150 mg	Didanosine	Comprimé à croquer, à mâcher ou à mettre en suspension		Dissoudre le comprimé dans l'eau ou du jus de pomme. Prendre 30 minutes avant un repas		1oui/1 + labo	A croquer ou dispersible// dispersion dans au moins 30 ml d'eau. Peut être diluée dans du jus de pomme pour plus d'arôme
Videx 125, 200, 250mg et 400mg	Didanosine	Gélule gastro résistante		A jeun. Ne pas croquer.	Videx 2g, poudre pour sol buv	3 non/5+labo	Ne pas ouvrir la gélule pour faciliter l'administration car la stabilité des granules gastro-résistants hors de la gélule n'a pas été étudiée

Viracept 250mg	Nelfinavir	Comprimé pelliculé		les cp peuvent être dispersés dans un demi-verre d'eau en remuant soigneusement et consommés immédiatement. Le verre doit être rincé avec un demi-verre d'eau et avalé afin de s'assurer que la totalité de la dose soit consommée. Ne pas utiliser en association avec des jus ou aliments acides (jus d'orange, jus de pomme ou compote de pomme) car ceci entraîne un goût amer. Prise au cours d'un repas. (DCP 07/09/2012)	Viracept 144g, poudre orale	3non/3	
Viramune 200mg	Nevirapine	Comprimé		Ne pas croquer.	Viramune 50mg/5ml, susp buv, fl. de 240ml	3non/3	
Viread 245mg	Tenofovir	Comprimé pelliculé		Peut être administré après avoir délité le cp dans au moins 100 ml d'eau, de jus d'orange ou de jus de raisin. (RCP 11/04/2012)		2non/2	
Visceralgine 50mg	Tiemonium	Comprimé pelliculé		-	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : spasfon lyoc ou debridat sol buvable	2 oui/2	
Visken 5mg	Pindolol	Comprimé		Ne pas croquer. (02/11/2012)		2oui/2 + labo	Aucune donnée // ce n'est pas une forme LP ni gastro-résistante // risque de perte de PA au moment du broyage// le cp broyé est à adm sur un aliment semi-solide et surtout ne pas dissoudre au préalable.
Vitamine B1 B6	Pyridoxine, Thiamine	Comprimé pelliculé		RCP 13/09/2012 Les cp st à avaler, sans les croquer, avec un verre d'eau. Theriaque 31/05/2012 Ne pas croquer, ni écraser		9 oui/10 + labo	aucune donnée mais PA sensible à la lumière
Vitamine B12 - 250µg	Cyanocobalamine	Comprimé sécable		-	Vitamine B12 1mg/2ml, sol buv, amp. de 1 et 2ml	1oui/1 + labo	Pas d'étude sur cps écrasés //PA photosensible mais cp peut être écrasé à condition qu'il soit administré immédiatement //pas d'enrobage
Vogalène 15mg	Metopimazine	Gélule		D'après RCP "ne pas les ouvrir"	Vogalene 0,1% sol buv, fl. 150ml; Vogalene 0,4% sol buv fl 30ml; Vogalene suppos 5mg, Vogalene lyoc 7,5mg	labo	Aucune étude sur la possibilité d'ouvrir les gel // Alternative par d'autres formes disponibles tels que la solution buvable ou le lyoc
Vogalene lyoc 7,5mg	Metopimazine	Lyophilisat oral		dispersible dans l'eau et dans la bouche. Ne pas croquer.			

Voltarene 25mg, 50mg, 100mg	Diclofenac	Comprimé enrobé gastro-résistant		Ne pas croquer. A administrer au cours du repas	Voltarene 100mg, suppositoire Autre AINS: Apranax sachet, Feldene 20mg etc...	7non/7	
Xanax 0,25mg, 0,50mg	Alprazolam	Comprimé sécable				4oui/4	
Xatral 2,5mg	Alfuzosine	Comprimé pelliculé				5 oui/7 + labo	Les cps sont à libération immédiate mais déconseillé de les écraser car pelliculage opaque qui permet de protéger le PA de la lumière et de masquer son amertume,
Xatral LP 10mg	Alfuzosine	Comprimé à libération prolongée		Ne pas croquer, Ne pas mâcher. Administrer après un repas.	Xatral 2,5 mg	10non/10 + labo	D'après le RCP,pr les cps à 10mg LP ils ne doivent pas être croqués, mâchés, écrasés ou broyés car il y a un risque de libération et d'absorption inappropriée et donc des EI pouvant être précoces. Ne pas utiliser cette forme galénique pour un passage en sonde // Si l'usage d'une sonde est indispensable préférer le cp à 2,5mg // Bioéquivalence entre 1 cp 10mg LP et 1cp de 2,5mg 3*/jours
Xeloda 150mg et 500mg	Capecitabine	Comprimé pelliculé		 Ne pas croquer. Produit cytotoxique Avaler 30 minutes après un repas. Therisque 08/08/11: Ne pas croquer, ni écraser (02/11/2012)		1 non/2 + labo	Le pelliculage masque le goût amer et minimise le risque pour le personnel de santé amené à avoir un contact direct avec le PA. Un essai randomisé de phase I de pharmacocinétique réalisée au CHU de Besançon (Hôpital Jean Minjoz), mené en cross-over chez 14 patients. Il a été administré alternativement des cp écrasés et des cp entiers. Cette étude montre que la prise de cp écrasés dilués ds 40ml d'eau, entraîne une absorption plus rapide et plus importante du PA et de ses métabolites, mais ne modifie pas leur aire sous la courbe. Les auteurs concluent que l'administration de cp écrasés pourrait être possible sans qu'une adaptation de dose soit nécessaire et que cette administration pourrait être une alternative intéressante chez les patients ayant des difficultés à avaler. Prendre en compte les risques liés à
Xyzall 5mg	Levocetirizine	Comprimé pelliculé		A administrer extemporanément		1/1 + labo	Les comprimés sont à libération immédiate et peuvent être écrasés et administrés extemporanément,
Zaditen LP 2mg	Ketotifene	Comprimé pelliculé à libération prolongée			Zaditen 1mg/5ml, sol buv, fl. de 150 ml		pas d'info labo mais alternative possible par Zaditen solution buvable
Zaditen 1mg	Ketotifene	Gélule		-	Zaditen 1mg/5ml, sol buv, fl. de 150 ml	2 oui/3	pas d'info labo mais alternative possible par Zaditen solution buvable
Zamudol LP 50, 100, 150 et 200mg	Tramadol	Gélule à libération prolongée		Ne pas écraser les microgranules	Orozamudol 50mg cp orodispersible	1 oui/1 + labo	D'après le RCP : Il est possible d'ouvrir les gélules, avec précaution, et de verser les granules dans une cuillère. Après avoir mis la cuillère et les granules dans la bouche, le patient absorbera un verre d'eau afin de rincer la bouche de tous les granules résiduels. Les granules ne doivent être ni croqués, ni écrasés.

Zeclar 250 mg et 500 mg	Clarithromycine	Comprimé pelliculé	 Par SNG	-	Zeclar 25mg/ml, granulés pr susp buv, fl. de 100ml; Zeclar 50mg/ml granulés pour susp buv fl 60ml	4 oui/6+labo	Non recommandé car goût très amer (mais possible par SNG)
Zeffix 100mg	Lamivudine	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer.	Zeffix 5mg sol buv fl 240ml	2 non/3 + labo	Pas de donnée concernant l'écrasement des cp, Cette utilisation est donc non recommandée, Existe sous forme de solution buvable,
Zelitrex 500mg	Valaciclovir	Comprimé pelliculé		-	Zovirax sol buvable	4 non/7+labo	Des études de pharmacocinétique des cp écrasés chez des enfants ont été menées mais ne permettent pas de conclure. Aucune donnée de stabilité des cp coupés ou écrasés et mélangés avec des aliments tels qu'une compote de pomme ou du pudding. (14/11/2012)
Zentel 400mg	Albendazole	Comprimé			Zentel suspension buvable à 400 mg/10 ml : Flacon de 10 ml	1 non/1	aucune étude faite. Les cp peuvent être croqués ou avalés avec un peu d'eau au moment des repas
Zerit 40mg	Stavudine	Gélule		prise à jeun. Les gélules doivent être prises immédiatement après sortie de la plaquette thermoformée. Le contenu de la gélule peut être mélangé à de l'eau ou de la nourriture et administré par sonde	Zerit poudre pour sol buv 200mg fl 200ml	2 oui/4 + labo	Dans l'AMM // mélange possible avec les aliments
Zestoretic 20 mg/12,5 mg (lisinopril + hydrochlorothiazide)	Hydrochlorothiazide, Lisinopril	Comprimé sécable				1 oui/1 + labo	Impossible de garantir la pharmacocinétique car aucune étude // possible mais non recommandé // cp très difficile à écraser // s'assurer que le PA et l'excipient forment bien un mélange homogène, que le patient a pris la totalité du produit // goût désagréable masqué par le pelliculage
Zestril 5mg, 20mg	Lisinopril	Comprimé (sécable pour le 5mg)		Administrer à heure fixe.		4oui/4	La formulation galénique n'empêche pas l'écrasement, mais aucune étude réalisée. Cp très difficile à écraser, Il faut s'assurer que le PA et les EE forment un mélange homogène, que le patient prenne tout le produit.
Ziagen 300mg	Abacavir	Comprimé pelliculé		Mélanger à une petite quantité de nourriture semi-solide ou de liquide, le tout devant être ingéré immédiatement.(RCP 03/09/2012)	Ziagen 20mg/ml, sol buv, fl. de 240ml	3non/3	
Zinnat 125, 250mg	Cefuroxime	Comprimé pelliculé		D'après le RCP "les cps doivent être avalés sans les croquer avec un verre d'eau".	Zinnat 125mg/5ml solution buvable ou sachets	labo	Déconseillé car son PA est amer, de plus une libération spécifique de celui-ci a été obtenue suite au développement galénique. Alternative zinnat 125 mg granulés pour suspension buvable en sachets ou en flacon

Zithromax 250mg	Azithromycine	Comprimé pelliculé		PA photosensible	Zithromax 40mg/ml, poudre pour susp buv, fl. de 30ml ou 37,5ml	4 non/5 + labo	Aucune étude menée donc le labo ne le recommande pas // Alternative par une solution buvable
Zocor 5, 20 et 40mg	Simvastatine	Comprimé pelliculé (sécable pour le 20mg)		Ne pas croquer. Administrer le soir au cours du repas.	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autre Statine: Elisor comp, Tahor 10 mg ou 40 mg etc...	3 non/4 + labo	Pas d'étude
Zoloft 50 mg	Sertraline	Gélule		Prise pendant les repas	<u>Sur avis et prescription médicale</u> : Autre antidépresseur sérotoninergique: Prozac 20 mg, Deroxat 20 mg etc...	7 non/8 + labo	Les gélules ne sont pas GR // mais en l'absence de donnée pas recommandé
Zomig	Zolmitriptan	Comprimé pelliculé			Zomigoro comprimé orodispersible	1 non/1	Les cp doivent être avalés. Alternative par la forme orodispersible qui se dissout rapidement dans la bouche et peut être avalée sans eau (ZomigOro peut être dispersé dans l'eau et être administré par SNG (20/11/12))
Zomigoro 2,5mg	Zolmitriptan	Comprimé orodispersible		Laisser fondre dans la bouche		3oui/3	
Zophren 4mg et 8mg	Ondansetron	Comprimé pelliculé		-	Zophren 4 mg/5 mL, sirop, fl. de 50 ml, Zophren lyoc	2 non/3 + labo	Pas de donnée clinique ou pharmacocinétique. Briser le cp exposerait le PA et pourrait rendre le produit amer. (14/11/2012)
Zophren 4mg et 8mg	Ondansetron	Lyophilisat oral		Laisser fondre dans la bouche	Zophren 4 mg/5 mL, sirop, fl. de 50 ml	5oui/5	aucune donnée (14/11/2012)
Zovirax 200 et 800 mg	Aciclovir	Comprimé			Zovirax 200mg/5ml sol buv, Zovirax 800mg/10ml susp buv	3non/3 + labo	Interdit d'écraser, Existe une forme de suspension buvable pour adulte et enfant (dosage à 200 mg)
Zyloric 100, 200 et 300mg	Allopurinol	Comprimé		Administrer après le repas		7 oui/8 + labo	Les cps sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, après les repas. Cependant leur écrasement est possible en cas de besoin (produit à lib immédiate, sans pelliculage, ni amer, ni photosensible). L'allopurinol est sensible à l'humidité. Le broyat ne peut donc être conservé plus de 24h avant utilisation. La meilleure façon de procéder est de broyer le cp peu de temps avant chaque prise.
Zyrtecset 10mg	Cetirizine	Comprimé pelliculé sécable		RCP 23/03/2012 Le cp doit être avalé avec une boisson.	Zyrtec sol buv 10mg/ml; Virlix 10mg/ml sol buv, Alairgix 10mg cp à sucer		Alternative possible par une solution buvable. Aucune donnée, écrasement est hors AMM. (12/11/12)
Zyprexa 5mg, 7,5mg, 10mg	Olanzapine	Comprimé enrobé		Ne pas croquer	Zyprexa velotab 5, 10, 15 et 20mg, cp orodispersibles	6non/6	
Zyvoxid 600mg	Linezolid	Comprimé pelliculé		-	Zyvoxid 100mg/5ml, granulés pr susp buv, fl. de 240ml	3non/3	