

PROTOCOLE D'UTILISATION DE LA NALOXONE

ANTAGONISTE DES OPIOIDES dont la MORPHINE

1°) OBJET

Cette procédure définit les modalités d'utilisation de la Naloxone (NARCAN®) en cas de surdosage d'un produit morphinique ou opioïde.

2°) REFERENCES

Article L.1110-5 du code de la santé publique : "... Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur.

Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée...".

Décret N° 2004- 802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires du CSP et modifiant certaines dispositions de ce code)

Décret n°2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier

Circulaire DHOS/E2 n°266 du 30 avril 2002 relative à la mise en œuvre du programme national de lutte contre la douleur 2002-2005 dans les établissements de santé.

Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

Circulaire n° 98/94 du 11 février 1999 relative à la mise en place de protocoles de prise en charge de la douleur aiguë par les équipes pluridisciplinaires médicales et soignantes dans les établissements de santé et institutions médico-sociales.

Vidal* et Thériaque* et recommandations en usage dans les établissements de soins.

3°) DOMAINES D'APPLICATION

Tout patient à domicile en HAD pour lequel un protocole de traitement à visée antalgique et à base de morphine est mis en place, et pour lequel des signes cliniques de surdosages sont observés. (cf. 5)

4°) DESTINATAIRES

Les professionnels médico - soignants de l'HAD et les libéraux, intervenants auprès des patients à domicile.

5°) DEFINITION

Le Chlorhydrate de Naloxone (Narcan®) est un antagoniste pur, spécifique et compétitif des morphinomimétiques et des morphines endogènes.

Une titration est indispensable pour évaluer la posologie nécessaire :

Le médicament se présente sous forme d'ampoule injectable à 0,4 mg.

Son administration peut se faire par voie IV mais en cas d'impossibilité de la voie veineuse, par voie sous cutanée ou IM.

Délai d'action : IV = 30 sec à 2 mn et durée d'action = 20 à 45 minutes

IM ou S/S cutanée = 3mn et durée d'action = 2 à 3 heures

La courte durée d'action de la Naloxone justifie la poursuite du traitement au-delà de l'instant de la levée des effets secondaires

Indication : Dépression respiratoire secondaire à un surdosage en morphine ou opioïde fort.

Contre-Indications : hypersensibilité à la Naloxone, hypersensibilité à l'excipient, hypersensibilité aux morphiniques

Précautions d'emploi : Un surdosage de la Naloxone peut entraîner une levée brutale de l'analgésie morphinique responsable d'une augmentation du débit cardiaque et des résistances systémiques sources d'augmentation de la consommation d'O₂

SIGNES CLINIQUES DU SURDOSAGE MORPHINIQUE ++++ :

Ralentissement du rythme respiratoire < 10 mouvements/minute,

pauses respiratoires,

myosis,

cyanose, avec saturation en O₂ basse < 90%

perte de conscience

6°) DESCRIPTION : TECHNIQUE

MATERIEL :

Kit Naloxone à mettre à disposition au domicile du patient :

- Patient sous Morphine ou opioïde par voie injectable, en administration continue ou non
- Patient débutant un traitement morphinique
- Patient en cours de réajustement, ou de relais, de traitement morphinique ou opioïde
 - NARCAN®(Naloxone) : « 3 Ampoules de 0.4 mg/ml / 1 ml
 - 1 seringue de 10 ml
 - 1 trocard
 - 1 aiguille IM/ , S/C , aiguille à ailettes (épicranienne)
 - 1 ampoule de NaCl 0,9% 20 ml
 - 1 flex NaCl 0,9% 100 ml
 - 1 perfuseur
 - 1 dispositif nécessaire à l'injection si point de piquage centralisé sur KT ou CIP

Préparer le traitement en respectant les règles d'asepsie en conformité avec les recommandations du CLIN

7°) RAPPEL DE L'ECHELLE de Sédation de RUDKIN

SCORE	ETAT du PATIENT	Cocher la case en rapport
1	Eveillé, orienté	
2	Somnolent	
3	Yeux fermés, répondant à l'appel	
4	Yeux fermés, répondant à une stimulation tactile légère*	
5	Yeux fermés, ne répondant pas à une stimulation tactile légère*	

ARBRE DECISIONNEL D'ADMINISTRATION de la NALOXONE (NARCAN*)

